

第2類医薬品

使用前にこの説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう保管してください。

外用鎮痒消炎薬

かゆみ止め
虫さされ

クリームワームS

しっしん
かぶれ

- ◆クリームワームSは配合成分の相乗作用により、かゆみを止め、炎症をとりさります。使用感のサッパリした家庭常備薬です。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
 - 湿潤やただれのひどい人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

効 能

虫さされ、かゆみ、じんましん、皮ふ炎、あせも、かぶれ、ただれ、湿疹、しもやけ

用法・用量

1日数回適量を患部にすりこむか、または塗布する。

<用法・用量に関する注意>

- 定められた用法を守ってください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 本剤は外用にのみ使用してください。

成分と作用

(100g中)

成分	分量	作用
ジフェンヒドラミン	1.0g	患部の炎症をしずめ、アレルギーを抑えます。
ジブカイン塩酸塩	0.3g	神経に働き、患部のいたみやかゆみをしずめます。
グリチルレチン酸	0.5g	湿疹・かぶれなどの炎症をしずめます。
l-メントール	3.0g	神経に働き、患部のいたみやかゆみをしずめます。
dℓ-カンフル	2.0g	患部の血行を良くし、いたみやかゆみをしずめます。

添加物として ステアリン酸、ベヘン酸、ステアリルアルコール、オレイルアルコール、スクワラン、プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリオキシエチレンソルビットミツロウ、トリエタノールアミン、水酸化K、コレステロール、パラベンを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)外箱に表示してある配置期限内に使用してください。

上手な使い方

クリームワームSはサラッとしたバニシングタイプのクリーム基剤によって作られた鎮痒消炎作用のある外用薬です。肌の上のクリームワームSが消えるまで、ていねいにすりこんでください。

1. 塗り薬は量よりも回数が大切です。ひどいときには、1日に3～4回塗り、治ってきたら回数を減らします。
2. 少量をうすくのばして塗るのがコツです。一度にたくさん塗ってもムダ使いです。強くすりこむのは刺激を与えることになり、かえって逆効果ですから、やさしくすりこんでください。
3. 患部の中心から塗らずに、その周囲から中心に向けて塗ってください。
4. 患部はつねに清潔にしておいてください。ふつうの石けんであらい、石けんが残らないように洗いながしてください。



本品についてのお問い合わせは下記に
お願いします。

池田薬品工業株式会社 お客様相談室

電話 (076) 472-3311 (大代表)

受付時間 平日 8:10～17:00



製造販売元

池田薬品工業株式会社

富山県中新川郡上市町若杉12