

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第2類医薬品

〈鎮痒消炎薬〉 かゆい湿疹・皮膚炎に

# エンクロン 軟膏EX

体内で低活性になるステロイド系治療薬

## 特長

○プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルは、アンテドラッグのステロイド剤で、湿疹、皮膚炎等の炎症を鎮めます。

### 「アンテドラッグとは」

- 皮膚表面の患部で効果を発揮したのち、体内に吸収されると低活性となる性質を持つ薬剤の総称です。

○抗ヒスタミン剤であるジフェンヒドラミン塩酸塩と鎮痒剤クロタミトンが、湿疹、かぶれ等に伴うかゆみを抑えます。

○トコフェロール酢酸エステルが血行を促進し、治療を助けます。

○殺菌剤イソプロピルメチルフェノールが患部の感染を防ぎ、症状の悪化を防ぎます。

○軟膏基剤が乾燥を防ぎ、皮膚を保護します。

## こんな症状にお使いください

かゆみ 湿疹 皮膚炎 かぶれ あせも じんましん 虫さされ




●かゆみ



●あせも



●かぶれ



●虫さされ

(必ず裏面もお読みください)

## ⚠ 使用上の注意



### してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
- 次の部位には使用しないでください  
(1)水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。  
(2)目の周囲、粘膜(例えば、口唇等)。
  - 顔面には、広範囲に使用しないでください
  - 長期連続して使用しないでください



### 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1)医師の治療を受けている人。  
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(4)患部が広範囲の人。  
(5)湿潤やただれのひどい人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

- 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

**【効能】** 皮膚炎、かゆみ、湿疹、かぶれ、あせも、じんましん、虫さされ

**【用法・用量】** 1日数回、適量を患部に塗擦してください。

#### 【用法・用量に関連する注意】

- 定められた用法・用量を守ってください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 外用にのみ使用してください。
- 本剤を塗擦後、患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。

#### 【成分(1g中)】

有効成分	含量	はたらき
プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	1.5mg	湿疹、皮膚炎等の炎症を抑えます。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	20mg	湿疹、かぶれ等に伴うかゆみを抑えます。
クロタミトン	50mg	
トコフェロール酢酸エステル	5mg	血行を促進し、治療を助けます。
イソプロピルメチルフェノール	1mg	患部の感染を防ぎ、症状の悪化を防ぎます。

添加物：白色ワセリン、流動パラフィン、ステアリン酸グリセリン、プロピレングリコール、BHT、*l*-メントール、pH調節剤

#### 【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- 使用後は必ずしっかりキャップを閉めてください。

**【お問合せ先】** お買い求めのお店又は下記にお問合せください

ライオン株式会社 お客様センター **0120-813-752**

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

発売元 **ライオン株式会社** 〒111-8644 東京都台東区蔵前1-3-28

製造販売元 **岩城製薬株式会社** 〒103-8434 東京都中央区日本橋本町4-8-2