

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

消炎鎮痛プラスター剤 Pain Relief Patch Hot

販売名:アスコラル

第3類医薬品

【特長】

- アスコラルは、温感刺激と鎮痛消炎作用により、こりや痛みによく効きます。
- アスコラルは、小さなサイズで貼りやすく、めだたない貼り薬です。

使用上の注意

※ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)  
次の部位には使用しないでください
- (1) 目の周囲、粘膜等。
  - (2) 湿疹、かぶれ、傷口。

※ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

成分・分量 100g中

サリチル酸メチル	5.0g	トコフェロール酢酸エステル	0.3g
dl-カンフル	1.5g	ノニル酸ワニリルアミド	0.02g
トメントール	3.5g		

添加物としてBHT、エステルガム、酸化亜鉛、生ゴム、ポリブテン、脂環族飽和炭化水素樹脂、三二酸化鉄、黒酸化鉄、黄色三二酸化鉄、その他2成分を含有します。

効能・効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

株式会社 大石膏盛堂 電話 (0942)83-2112  
受付時間 午前9:00～午後5:00(土、日、祝日を除く)

用法・用量

1日1～2回薬面の上のライナーをはがして患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (3) 患部の皮膚は清潔にして、汗などをよく拭き取ってからお貼りください。
- (4) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の薄片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (5) 皮膚の特に弱い人は、同じところに続けて貼らないでください。
- (6) 貼ったまま入浴されると強い刺激を感じるため、入浴30分～1時間前にはがしておはってください。また、入浴直後の貼付は避けてください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、保存袋に入れて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製造番号

包装:直径2.8cm/枚…156枚入  
保存袋付

使用期限

副作用被害救済制度  
☎ 0120(149)931



製造販売元 株式会社大石膏盛堂 佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地

開封