

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第3類医薬品

消炎鎮痛パップ剤 **ゲーリック®**

## 【特長】

- ゲーリックは、においをおさえた微香性タイプで肌にやさしい弱酸性の冷感パップ剤です。
- ゲーリックは、アルニカチンキを配合し炎症や痛み及び血行促進にすぐれた効きめを発揮します。
- ゲーリックは、タテ・ヨコに伸縮性のある不織布を使用していますので、はがれやすい部位にもピッタリフィットします。

## ⚠【使用上の注意】

❌ **してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。

**相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 【効能・効果】

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

## 【用法・用量】

1日1～2回薬面の上のライナーをはがして患部にお貼りください。

## ＜使用方法＞

- (1) 必要であれば、包帯か固定用粘着テープで固定してください。
- (2) 患部の広さに応じてライナーの上から適当な大きさに切ってお使いください。
- (3) 貼る前に、タテ・ヨコに2～3回軽く伸ばして貼るとよりピッタリ貼れます。

## ＜上手な貼り方＞

- (1) 薬面のライナーを3分の1ほどはがして患部に貼付して固定します。
- (2) ゆっくり残りのライナーをはがしながら貼付してください。

## ＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 患部の皮膚は清潔にし、汗等をよく拭き取ってからお貼りください。

## 【成分・分量】

膏体100g中に次の成分を含んでいます。(1枚28g)  
 サリチル酸グリコール …… 1.0g  
 l-メントール …… 0.5g  
 トコフェロール酢酸エステル… 0.2g  
 アルニカチンキ …… 1.0mL  
 (原生薬換算量0.2g)

添加物としてエデト酸Na、ゼラチン、アクリル酸デンプン、カルボキシビニルポリマー、グリセリン、D-ソルビトール、ヒマシ油、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、エタノール、その他2成分を含有します。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 品質保持のため、未使用分はこの袋に入れ、開封口をきちんとしめ、外気にふれないようにして保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製造販売元 株式会社 大石膏盛堂 佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地

製品についてのお問い合わせは、下記にお願いいたします。  
 株式会社 大石膏盛堂 電話 (0942) 83-2112  
 受付時間 午前9:00～午後5:00(土、日、祝日を除く)

製造番号

使用期限

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

