

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。



第3類医薬品

ホッカパス

【特長】

- ホッカパスは、温感刺激と鎮痛消炎作用により、こりや痛みによく効きます。
- ホッカパスは、小さなサイズで貼りやすく、めだたない貼り薬です。

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の部位には使用しないでください

- (1)目の周囲、粘膜等。
- (2)湿疹、かぶれ、傷口。

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用前、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

3. 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【成分・分量】

膏体100g中に次の成分を含んでいます。

成分	含量
サリチル酸メチル	5.0g
d-トカンフル	1.5g
トメントール	3.5g
トコフェロール酢酸エステル	0.3g
ノナン酸バニリルアミド	0.02g

添加物としてBHT、エステルガム、酸化亜鉛、生ゴム、ポリブテン、脂環族飽和炭化水素樹脂、三二酸化鉄、黒酸化鉄、黄色三二酸化鉄、その他2成分を含有します。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

株式会社 大石膏盛堂 電話 (0942) 83-2112
受付時間 午前9:00～午後5:00(土、日、祝日を除く)

【効能・効果】

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

【用法・用量】

1日1～2回薬面の上のライナーをはがして患部に貼付してください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (3)患部の皮膚は清潔にして、汗などをよく拭きとってからお貼りください。
- (4)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い個所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (5)皮膚の特に弱い人は、同じところに続けて貼らないでください。
- (6)貼ったまま入浴されると強い刺激を感じるため、入浴30分～1時間前にはがしておはぐいください。また、入浴直後の貼付はさけてください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)品質保持のため、未使用分は袋に入れ、保存袋に入れて保管してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

【包装】

直径2.8cm/枚……156枚入 保存袋付

製造番号

使用期限



副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931



4 987475 116251

製造販売元 株式会社大石膏盛堂 佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地

開け口

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第3類医薬品 **ホッカパス**

〔特徴〕

- ホッカパスは、温感刺激と鎮痛消炎作用により、こりや痛みによく効きます。
- ホッカパスは、小さなサイズで貼りやすく、めだたない貼り薬です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

く守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります

次の部位には使用しないでください

- (1)目の周囲、粘膜等。
- (2)湿疹、かぶれ、傷口。

💬 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1)本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (2)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1)使用后、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

- (2)5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

〔成分・分量〕

膏体100g中に次の成分を含んでいます。

成分	含量
サリチル酸メチル	5.0g
dI-カンフル	1.5g
l-メントール	3.5g
トコフェロール酢酸エステル	0.3g
ノニル酸ワニリルアミド	0.02g

添加物としてBHT、エステルガム、酸化亜鉛、生ゴム、ポリブテン、脂環族飽和炭化水素樹脂、三二酸化鉄、黒酸化鉄、黄色三二酸化鉄、その他2成分を含有します。

〔効能・効果〕

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

〔用法・用量〕

1日1～2回薬面の上のライナーをはがして患部に貼付してください。

く用法・用量に関連する注意

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (3)患部の皮ふは清潔にして、汗などをよく拭きとってからお貼りください。
- (4)皮ふの弱い人は、使用前に腕の内側の皮ふの弱い個所に1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (5)皮ふの特に弱い人は、同じところに続けて貼らないでください。
- (6)貼ったまま入浴されると強い刺激を感じるため、入浴30分～1時間前にはがしておはいいてください。また、入浴直後の貼付はさけてください。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)品質保持のため、未使用分は袋に入れ、保存袋に入れて保管してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

〔包装〕

直径2.8cm/枚……120枚入 保存袋付

製造番号

使用期限



開
け
口



製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

製造販売元 **株式会社大石膏盛堂** 佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地

電話 (0942)83-2112

受付時間 午前9:00～11:45 午後1:00～4:30(土、日、祝日を除く)