

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

3ZR703045

第2類医薬品

エイクレス®

特 長

- エイクレスは局所麻酔薬リドカインを配合していますので肩こり、筋肉痛などにすぐれた効き目を発揮します。
- エイクレスはL-メントールの刺激によりすぐれた消炎・鎮痛作用を發揮します。
- エイクレスは粘着性のある基剤と伸縮性のある不織布を使用していますので、はがれやすい部位にもピッタリとフィットします。

⚠(使用上の注意)

⊗してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、
副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

- (1)目の周囲、粘膜等。
- (2)湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3.5～6日間使用しても症状がよくなりないう場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛

【用法・用量】

1日1～2回薬面の上のライナーをはがして患部にお貼りください。

【使用方法】

- (1)必要があれば、包帯が固定用粘着テープで固定してください。
- (2)患部の広さに応じてライナーの上から適当な大きさに切ってお使いください。
- (3)貼る前に、タテ・ヨコに2～3回軽く伸ばして貼るとよりピッタリ貼れます。

【用法・用量に関連する注意】

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)本剤は、痛みやはれなどの原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれなどの症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い個所に1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (5)患部の皮膚は清潔にし、汗等をよく拭きとってからお貼りください。

【成分・分量】

膏体100g中に次の成分を含んでいます。(1枚10g)

リドカイン……0.5g L-メントール…0.75g

添加物としてエデト酸Na、グリセリン、D-ソルビトール、ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、ヒマシ油、ジソプロパノールアミン、カルボキシビニルポリマー、pH調節剤、ポリソルベート80、その他1成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)品質保持のため、未使用分はこの袋に入れ、開封口をきちんとしめ、外気にふれないようにして保管してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製造番号

製造販売元 株式会社 大石膏盛堂 佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地

製品についてのお問い合わせは、下記にお願いいたします。

株式会社 大石膏盛堂 電話 (0942)83-2112

受付時間 午前9:00～午後5:00(土、日、祝日を除く)

使用期限

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

0-2

