

鎮痛消炎テープ剤 Pain Relief Patch

第2類
医薬品

開け口

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要ときに読めるように大切に保管してください。

温感ホームパスFRテープV

【特長】

- 温感ホームパスFRテープVは痛みの原因物質の生成を抑えることにより、肩の痛み、腰痛、関節痛などに効果をあらわすフェルピナクを1枚あたり35mg配合しています。
- 温感ホームパスFRテープVは柔軟性のある基布を使用していますので、粘着性にすぐれ関節部にもよくフィットします。

効能・効果:腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

用法・用量

表面のライナーをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。(2)本剤は、痛みやはれなどの原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれなどの症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。(3)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い個所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめしてから使用してください。(4)患部の皮膚は清潔にし、汗等をよく拭き取ってからお貼りください。(5)貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。(6)貼ったまま入浴されると強い刺激を感じるため、入浴30分～1時間前にはがしておはうください。また、入浴直後の貼付はさけてください。

成分・分量 膏体100g中に次の成分を含んでいます。

フェルピナク5.0g、*l*-メントール3.0g、トコフェロール酢酸エステル2.3g

添加物としてスチレン-インソレン-スチレンブロック共重合体、ポリイソブチレン、流動パラフィン、脂環族飽和炭化水素樹脂、ノナン酸パニリルアミド、その他2成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因により品質が変わります)(4)品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開封口のチャックを閉めて保管してください。(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

肩の痛み

腰痛 関節痛

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 1.次の人は使用しないでください
 - (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
 - (2)ぜんそくを起こしたことがある人。
 - (3)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (4)15歳未満の小児。
- 2.次の部位には使用しないでください
 - (1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。
 - (3)みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- 3.連続して2週間以上使用しないでください

⊗ 相談すること

- 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2.使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、痛み、かぶれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック(アナフィキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

- 3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

副作用被害救済制度 ☎0120(149)931



MADE IN JAPAN



環境にやさしい
パッケージです。
R30
使用済インクを回収して再利用

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いたします。電話(0942)83-2112
株式会社 大石膏盛堂 佐賀県鳥栖市本町1丁目93番地
受付時間 午前9:00～午後5:00(土、日、祝日を除く)

株式会社大石膏盛堂

製造販売元