

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第3類医薬品

消炎鎮痛パップ剤

温感 ユーシップ[®]L

【特長】

- 温感ユーシップLは、トウガラシエキス配合により患部に心地よい温感刺激を与え、血液循環作用をよくし、腰痛、肩こり、関節痛などの慢性疾患にすぐれた効果を発揮します。
- 温感ユーシップLは、粘着性に優れた基剤とタテ・ヨコに伸縮性のある不織布を使用していますので、はがれやすい部位にもピッタリとフィットします。

⚠️【使用上の注意】

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。 (2) 湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

製品についてのお問い合わせは、下記をお願いいたします。

株式会社 大石膏盛堂

電話 (0942) 83-2112

受付時間 午前9:00~午後5:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

【効能・効果】

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

【用法・用量】

ライナー(プラスチックフィルム)をはがし、1日1~2回患部に貼付してください。

【使用方法】

- (1) 必要であれば包帯、テープ等で止めてください。
- (2) 患部の広さに応じてライナーの上から適当な大きさに切ってお使いください。
- (3) 貼る前に、タテ・ヨコに2~3回軽く伸ばして貼るとよりピッタリ貼れます。

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 患部の皮膚は清潔にし、汗等をよく拭き取ってからお貼りください。
- (3) 葉面に触れた手で目、唇、鼻孔、その他の粘膜には触らないでください。
- (4) 打撲、捻挫にははれがひいてからご使用ください。
- (5) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (6) 少なくとも入浴の1時間前にははがしてください。また入浴後は30分くらいしてから貼付してください。

【成分・分量】

膏体100g中に次の成分を含んでいます。(1枚14g)

サリチル酸グリコール…1.0g

dl-カンフル…0.3g

トコフェロール酢酸エステル…0.2g

トウガラシエキス…0.3g(原生薬換算量3.75g)

添加物としてエデト酸Na、ゼラチン、カオリン、カルメロースNa、グリセリン、D-ソルビトール、尿素、ヒマシ油、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、その他2成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開封口のチャックを開けて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



製造販売元

株式会社大石膏盛堂

佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地



ここを押して
開けてください。