

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

ここを押して
開けてください。



第2類医薬品

コホーパスFRテープV

[特長]

- コホーパスFRテープVは痛みの原因物質の生成を抑えることにより、肩の痛み、腰痛、関節痛などに効果をあらわすフェルビナクを1枚あたり35mg配合しています。
- コホーパスFRテープVは柔軟性のある基布を使用していますので、粘着性にすぐれ関節部にもよくフィットします。

△(使用上の注意)

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤・かゆみ・かぶれ等)を起こしたことがある人。
- (2) ゼンそくを起こしたことがある人。
- (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (4) 15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 温疹・かぶれ・傷口。
- (3) みすみしむし等又は化膿している患部。

3. 連続して2週間以上使用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤・かゆみ・はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

株式会社大石膏盛堂

電話 (0942) 83-2112

受付時間 午前9:00~午後5:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

[効能・効果]

腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとは別)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

[用法・用量]

表面のライナーをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は、痛みやはれなどの原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれなどの症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。
- (3) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い個所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤・かゆみ・かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (4) 患部の皮膚は清潔にし、汗等をよく拭き取ってからお貼りください。

[成分・分量]

膏体100g中に次の成分を含んでいます。

フェルビナク 5.0g

L-メントール 4.2g

トコフェロール酢酸エチル 2.3g

添加物としてジソプロパノールアミン、ポリソブチレン、流動パラフィン、脂環族飽和炭化水素樹脂、その他2成分を含有します。

[保管及び取扱い上の注意]

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になります品質が変わります)
- (4) 品質保持のため、未使用分は袋に入り、開封口のチャックを開めて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



4 987475 117197
製造販売元 株式会社大石膏盛堂
佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地

