

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

鎮痛消炎
パップ剤

ダイハップFR

[特長]

- ダイハップFRは、痛みの原因物質(プロスタグランジン)の生成を抑え、肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛などに効果をあらわすフェルビナクを配合しています。
- ダイハップFRは、粘着性に優れた基剤[※]と伸縮自在の不織布を使用していますので、関節部にもよくフィットします。

*特許第4410431号

⚠ [使用上の注意]

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤・かゆみ・かぶれ等)を起したことがある人。

(2)ぜんそくを起したことがある人。

(3)妊婦又は妊娠していると思われる人。

(4)15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください

(1)目の周囲、粘膜等。

(2)湿疹・かぶれ、傷口。

(3)みずみし・たむし等又は化膿している患部。

3. 連続して2週間以上使用しないでください

⚑ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1)医師の治療を受けている人。

(2)薬などによりアレルギー症状を起したことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位 症状

皮膚 発疹・発赤・かゆみ・はれ、ヒリヒリ感・かぶれなど

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称 症状

ショック 使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、(アナフィラキシー)のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

製造販売元 株式会社 大石膏盛堂 佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地
電話 (0942) 83-2112

受付時間 午前9:00~午後5:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ■ 0120-149-931

開けてください。
ここを押してください。

[効能・効果]

打撲、捻挫、筋肉痛、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)、肩こりに伴う肩の痛み

[用法・用量]

表面のライナーをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

[使用方法]

●片側のライナーをはがし、薬面を患部に貼り、残りの片側のライナーをはがします。

●汗でぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。

[用法・用量に関する注意]

(1)用法・用量を厳守してください。
(2)本剤は、痛みやはれなどの原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれなどの症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。

(3)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い個所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤・かゆみ・かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

[成分・分量]

膏体100g中に次の成分を含んでいます。(1枚14g)

フェルビナク…0.5g

添加物としてエデト酸Na、ゼラチン、l-メントール、カルボキシビニルポリマー、グリセリン、ジイソプロパノールアミン、D-ソルビトール、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸メチル、ヒマシ油、ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、pH調節剤、その他2成分を含有します。

[保管及び取り扱い上の注意]

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れかねいでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)

(4)品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開封口のチャックを閉めて保管してください。

(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

【ライナーのはがし方】



①のライナーをはがします



患部に貼りながら②のライナーをはがしてください

