

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

## 第3類医薬品

# ダイハップ温感パッチ

### 使用上の注意

#### 【X】してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

(1)目の周囲、粘膜等。

(2)湿疹、かぶれ、傷口。

#### 【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤・かゆみ・痛み

3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### 【成分・分量】

膏体100g中に次の成分を含んでいます。

成 分	含 量
サリチル酸メチル	5.0g
dl-カンフル	1.5g
I-メントール	3.5g
トコフェロール酢酸エステル	0.3g
ノナン酸バニリルアミド	0.02g

添加物としてBHT、エステルガム、酸化亜鉛、生ゴム、ポリブテン、脂環族飽和炭化水素樹脂、三二酸化鉄、黒酸化鉄、黄色三二酸化鉄、その他2成分を含有します。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

製造販売元 株式会社 大石膏盛堂 佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地  
電 話 (0942) 83-2112

受付時間 午前9:00～午後5:00(土、日、祝日を除く)

### 【効能・効果】

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しみやけ、骨折痛

### 【用法・用量】

1日1～2回薬面の上のライナーをはがして患部に貼付してください。

### 【用法・用量に関する注意】

(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(2) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。

(3) 患部の皮膚は清潔にして、汗などをよく拭き取ってからお貼りください。

(4) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い個所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤・かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

(5) 皮膚の特に弱い人は、同じところに続けて貼らないでください。

(6) 貼ったまま入浴されると強い刺激を感じるため、入浴30分～1時間前にはがしておはいりください。また、入浴直後の貼付はさけてください。

### 【保管及び取り扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)

(4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、保存袋に入れて保管してください。

(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

### 【包装】

直径2.8cm/枚……156枚入 保存袋付

製造番号

使用期限



日本製 MADE IN JAPAN

【貼り方の参考例】 下図を参考に痛みを感じるところを中心に貼ってください。

