

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

## トップパス温感パッチ 第3類医薬品

【特長】

- トップパス温感パッチは、温感刺激と消炎鎮痛作用により、こりや痛みによく効きます。
- トップパス温感パッチは、小さなサイズで貼りやすく、めだたない貼り薬です。

### ⚠ 使用上の注意

#### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)  
次の部位には使用しないでください

- (1)目の周囲、粘膜等。
- (2)湿疹、かぶれ、傷口。

#### 🗨 相談すること

- 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2.使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症状           |
|------|--------------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ、痛み |

- 3.5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### 【成分・分量】

膏体100g中に次の成分を含んでいます。

| 成分            | 含量    |
|---------------|-------|
| サリチル酸メチル      | 5.0g  |
| dI-カンフル       | 1.5g  |
| l-メントール       | 3.5g  |
| トコフェロール酢酸エステル | 0.3g  |
| ノナン酸バニリルアミド   | 0.02g |

添加物としてBHT、エステルガム、酸化亜鉛、生ゴム、ポリブテン、脂環状飽和炭化水素樹脂、三酸化鉄、黒酸化鉄、黄色三酸化鉄、その他2成分を含有します。

### 【効能・効果】

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

### 【用法・用量】

1日1～2回薬面の上のライナーをはがして患部に貼付してください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (3)患部の皮膚は清潔にして、汗などをよく拭き取ってからお貼りください。
- (4)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い個所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (5)皮膚の特に弱い人は、同じところに続けて貼らないでください。
- (6)貼ったまま入浴されると強い刺激を感じるため、入浴30分～1時間前にはがしておはよりください。また、入浴直後の貼付はさせていただきます。

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)品質保持のため、未使用分は袋に入れ、保存袋に入れて保管してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

### 【包装】

直径2.8cm/枚……168枚入 保存袋付

製造番号

使用期限



製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

製造販売 株式会社大石膏盛堂 佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地

電話 (0942)83-2112

受付時間 午前9:00～午後5:00(土、日、祝日を除く)