

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

消炎鎮痛パップ剤 第3類医薬品

# ラクトパス冷感シップ

## 【特長】

- ラクトパス冷感シップは、サリチル酸グリコールとグリチルレチン酸の2つの効果ですぐれた消炎作用を発揮します。
- ラクトパス冷感シップは、粘着性のある基剤と伸縮性のある不織布を使用していますので、はがれやすい部位にもピッタリとフィットします。

## ⚠(使用上の注意)

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

株式会社大石膏盛堂

電話 (0942) 83-2112

受付時間 午前9:00～午後5:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

## 【効能・効果】

腰痛、打撲(うちみ)、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労

## 【用法・用量】

表面のライナーをはがし、1日1～2回、患部に貼付けてください。

## 〈使用方法〉

- (1) 必要であれば包帯、テープ等で止めてください。
- (2) 患部の広さに応じてライナーの上から適当な大きさに切ってお使いください。
- (3) 貼る前に、タテ・ヨコに2～3回軽く伸ばして貼るとよりピッタリ貼れます。

## 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 患部の皮膚は清潔にし、汗等をよく拭きとってからお貼りください。

## 【成分・分量】

膏体100g中に次の成分を含んでいます。(1枚14g)

サリチル酸グリコール……………1.0g

dl-カンフル……………0.3g

l-メントール……………0.5g

トコフェロール酢酸エステル……………0.3g

グリチルレチン酸……………0.05g

添加物としてエデト酸Na、モノラウリン酸ソルビタン、グリセリン、D-ソルビトール、カルボキシビニルポリマー、カルメロースナトリウム、ポリアクリル酸部分中和物、酸化チタン、pH調節剤、その他3成分を含有します。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開封口のチャックを閉めて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製造販売元

株式会社大石膏盛堂

佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地



この用紙には古紙パルプが利用されています。

ここを押して  
開けてください。