

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

⚠️(使用上の注意)

❌してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

- (1)目の周囲、粘膜等。
- (2)湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

[効能・効果]

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

製造番号

使用期限

140枚入(20枚×7) サイズ 6.5cm×4.2cm

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

製造販売元 **株式会社大石膏盛堂** 佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地

電話(0942)83-2112 受付時間 午前9:00~午後5:00(土、日、祝日を除く)

ワールドパスE

[用法・用量]

1日1~2回薬面の上のライナーをはがして患部に貼付してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)患部の皮膚は清潔にし、汗等をよく拭き取ってからお貼りください。
- (3)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い個所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (4)皮膚の特に弱い人は、同じところには続けて貼らないでください。

[成分・分量]

膏体100g中に次の成分を含んでいます。

成分	含量
d-カンフル	1.21g
l-メントール	7.25g
サリチル酸メチル	5.44g
トコフェロール酢酸エステル	1.29g

添加物としてBHT、エステルガム、酸化亜鉛、生ゴム、ポリブテン、その他2成分を含有します。

[保管及び取扱い上の注意]

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)品質保持のため、未使用分は袋に入れ、保存袋に入れて保管してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。