

開き口

第3類
医薬品

パスマンVS

特長

- * 消炎鎮痛作用と温感刺激による血行促進作用により、肩のこり、腰の痛み、関節痛等への効果を発揮します。
- * ムシやかぶれを防ぐために気孔をつけ、通気性をもたせたブラスターです。

〔成分・分量〕

膏体100g中に次の成分を含んでいます。

l-メントール	5.71g
サリチル酸メチル	6.29g
dl-カンフル	1.5g
トコフェロール酢酸エステル	2.0g
ノナン酸バニリルアミド	5mg

添加物としてBHT、酸化亜鉛、ポリブテン、ポリイソブチレン、赤色225号、橙色403号、生ゴム、その他2成分を含有します。

〔効能・効果〕

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

〔用法・用量〕

1日1～2回薬面のライナーをはがして患部に貼付してください。

1枚(7cm×5.5cm)

ロット

配置期限

〔注意〕

1. 次の部位には使用しないでください。
 - (1) 目の周囲、粘膜等。
 - (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
2. 使用に際しては、説明文書をよくお読みください。
3. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
4. 小児の手の届かない所に保管してください。

○製品についてのお問い合わせは、下記にお願いいたします。

製造販売元 株式会社 大石膏盛堂
佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地

電話 (0942)83-2112
受付時間 午前9:00～午後5:00(土、日、祝日を除く)

〔用法・用量〕 1日1～2回薬面のライナーをはがして患部に貼付してください。

3ZR703158

<用法・用量に関連する注意>

O-1

(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2) 患部の皮膚は清潔にして、汗などをよく拭きとってからお貼りください。(3) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。(4) 貼ったまま入浴しますと強い刺激を感じるため入浴30分～1時間前にはがしてください。また、入浴直後の貼付はさけてください。(5) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い個所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。(6) 皮膚の特に弱い人は、同じところには続けて貼らないでください。

〔保管及び取扱い上の注意〕

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)(4) 品質保持のため、未使用分はこの袋に入れ、外箱に入れて保管してください。(5) 配置期限を過ぎた製品は使用しないでください。

こりと痛みに

第3類医薬品

外用貼付薬

気孔付



製造販売元 株式会社 大石膏盛堂
佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように外箱とともに大切に保管してください。

〔成分・分量〕 膏体100g中に次の成分を含んでいます。

l-メントール…5.71g サリチル酸メチル…6.29g dl-カンフル…1.5g トコフェロール
酢酸エステル…2.0g ノナン酸バニリルアミド…5mg

添加物としてBHT、酸化亜鉛、ポリブテン、ポリイソブチレン、赤色225号、橙色403号、生ゴム、その他2成分を含有します。

▲ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、

この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能・効果〕 腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛