

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

消炎鎮痛パップ剤 第3類医薬品

ラクトパス冷感シップ[®] ハーフサイズ

【特長】

- ラクトパス冷感シップは、サリチル酸グリコールとグリチルレチン酸の2つの効果ですぐれた消炎作用を発揮します。
- ラクトパス冷感シップは、粘着性のある基剤と伸縮性のある不織布を使用していますので、はがれやすい部位にもピッタリとフィットします。

⚠️【使用上の注意】

☒ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の部位には使用しないでください
(1)目周囲、粘膜等。
(2)湿疹、かぶれ、傷口。

💬 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

株式会社大石膏盛堂
電話 (0942) 83-2112
受付時間 午前9:00~午後5:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

【効能・効果】

腰痛、打撲(うちみ)、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労

【用法・用量】

表面のライナーをはがし、1日1~2回、患部に貼付してください。

【使用方法】

- (1)必要であれば包帯、テープ等で止めてください。
 - (2)患部の広さに応じてライナーの上から適当な大きさに切ってお使いください。
 - (3)貼る前に、タテ・ヨコに2~3回軽く伸ばして貼るとよりピッタリ貼れます。
- 【用法・用量に関する注意】
- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
 - (2)患部の皮膚は清潔にし、汗等をよく拭きとてからお貼りください。

【成分・分量】

膏体100g中に次の成分を含んでいます。(1枚7g)

サリチル酸グリコール……………1.0g

dl-カンフル……………0.3g

l-メントール……………0.5g

トコフェロール酢酸エステル……………0.3g

グリチルレチン酸……………0.05g

添加物としてエデト酸Na、モノラウリン酸ソルビタン、グリセリン、D-ソルビトール、カルボキシビニルポリマー、カルメロースナトリウム、ポリアクリル酸部分中和物、酸化チタン、pH調節剤、その他3成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開封口のチャックを閉めて保管してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製造販売元

株式会社大石膏盛堂

佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地



この用紙には古紙パルプが利用されています。

