ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第3類医薬品 ホッカパス温膏

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

次の部位には使用しないでください

(1)目の周囲、粘膜等。

(2)湿疹、かぶれ、傷口。

相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能・効果〕

腰痛、打撲(うちみ)、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労

〔用法・用量〕

表面のライナーをはがし、1日1～2回、患部に貼付けてください。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(2)貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。

(3)患部の皮膚は清潔にし、汗等をよく拭きとってからお貼りください。

(4)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

(5)皮膚の特に弱い人は、同じところに続けて貼らないでください。

(6)貼ったまま入浴されると強い刺激を感じるため、入浴30分～1時間前にはがしておはいりください。また、入浴直後の貼付はさけてください。

〔成分・分量〕

膏体100ｇ中に次の成分を含んでいます。

成　分	含　量
サリチル酸メチル	7.17g
dl-カンフル	2.51g
l-メントール	3.50g
トコフェロール酢酸エステル	1.00g
ノナン酸バニリルアミド	0.02g

添加物としてエステルガム、黄色三二酸化鉄、黒酸化鉄、軽質無水ケイ酸、酸化亜鉛、三二酸化鉄、脂環族飽和炭化水素樹脂、脂肪族炭化水素樹脂、スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、生ゴム、BHT、ポリイソブチレン、流動パラフィンを含有します。

〔保管及び取扱い上の注意〕

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)

(4)品質保持のため、開封後は袋ごと「保存袋」に入れて保管してください。

(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

〔包装〕

直径2.8cm/枚……156枚入　保存袋付

製造番号

使用期限

日本製　MADE IN JAPAN

【貼り方の参考例】 下図を参考に痛みを感じるところを中心に貼ってください。



製造販売元　株式会社大石膏盛堂　佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地

副作用被害救済制度
0120-149-931

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。
製造販売元　株式会社大石膏盛堂
電話　(0942)83-2112
受付時間　午前9:00～午後5:00（土、日、祝日を除く）

4 987475 118453

開け口

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第3類医薬品

ホッカパス温膏

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

次の部位には使用しないでください

(1)目の周囲、粘膜等。

(2)湿疹、かぶれ、傷口。

相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能・効果〕

腰痛、打撲(うちみ)、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労

〔用法・用量〕

表面のライナーをはがし、1日1～2回、患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(2)貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。

(3)患部の皮膚は清潔にし、汗等をよく拭きとってからお貼りください。

(4)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

(5)皮膚の特に弱い人は、同じところに続けて貼らないでください。

(6)貼ったまま入浴されると強い刺激を感じるため、入浴30分～1時間前にはがしておはいりください。また、入浴直後の貼付はさけてください。

〔成分・分量〕

膏体100ｇ中に次の成分を含んでいます。

成　分	含　量
サリチル酸メチル	7.17g
dl-カンフル	2.51g
l-メントール	3.50g
トコフェロール酢酸エステル	1.00g
ノナン酸バニリルアミド	0.02g

添加物としてエステルガム、黄色三二酸化鉄、黒酸化鉄、軽質無水ケイ酸、酸化亜鉛、三二酸化鉄、脂環族飽和炭化水素樹脂、脂肪族炭化水素樹脂、スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、生ゴム、BHT、ポリイソブチレン、流動パラフィンを含有します。

〔保管及び取扱い上の注意〕

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)

(4)品質保持のため、開封後は袋ごと「保存袋」に入れて保管してください。

(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

〔包装〕

直径3.9cm/枚……78 枚入　保存袋付

製造番号

使用期限

日本製　MADE IN JAPAN

【貼り方の参考例】下図を参考に痛みを感じるところを中心に貼ってください。



製造販売元　株式会社大石膏盛堂　佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。
製造販売元　株式会社大石膏盛堂
電　話　(0942)83-2112
受付時間　午前9:00～午後5:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度
0120-149-931

4 987475 118460

開け口