

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

消炎鎮痛プラスタージェル Pain Relief Patch Hot

販売名：**ホームパス温膏**

第3類医薬品

特長

- ホームパス温膏は、温感刺激と鎮痛消炎作用により、こりや痛みによく効きます。
- ホームパス温膏は、小さなサイズで貼りやすく、めだたない貼り薬です。

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果 腰痛、打撲(うちみ)、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労

用法・用量

表面のライナーをはがし、1日1～2回、患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (3) 患部の皮膚は清潔にし、汗等をよく拭きとってからお貼りください。
- (4) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (5) 皮膚の特に弱い人は、同じところに続けて貼らないでください。
- (6) 貼ったまま入浴されると強い刺激を感じるため、入浴30分～1時間前にはがしておはってください。また、入浴直後の貼付はさけてください。

成分・分量 膏体100g中

サリチル酸メチル	7.17g	トコフェロール酢酸エステル	1.00g
dl-カンフル	2.51g	ノナン酸バニリルアミド	0.02g
l-メントール	3.50g		

添加物としてエステルガム、黄色三酸化鉄、黒酸化鉄、軽質無水ケイ酸、酸化亜鉛、三酸化鉄、脂環族飽和炭化水素樹脂、脂肪族炭化水素樹脂、ステレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、生ゴム、BHT、ポリイソブチレン、流動パラフィンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 品質保持のため、開封後は袋ごと「保存袋」に入れて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

製造番号

使用期限



ミックス
パッケージ

FSC FSC® C000000

直径2.8cm/枚



製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

株式会社大石膏盛堂
電話 (0942)83-2112
受付時間 午前9:00～午後5:00
(土、日、祝日を除く)



4 987475 118538

製造販売元 **株式会社大石膏盛堂** 佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地

開け口