

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第3類医薬品 アウチレス温膏

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなります)
次の部位には使用しないでください

- (1)目の周囲、粘膜等。
- (2)湿疹、かぶれ、傷口。

☒ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤・かゆみ・痛み

3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能・効果〕

腰痛、打撲(うちみ)、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労

〔用法・用量〕

表面のライナーをはがし、1日1～2回、患部に貼付してください。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (3) 患部の皮膚は清潔にし、汗等をよく拭きとてからお貼りください。
- (4) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を自安として半日以上貼り、発疹・発赤・かゆみ・かぶれ等の症状が起きないことを確認からめてから使用してください。
- (5) 皮膚の特に弱い人は、同じところに続けて貼らないでください。
- (6) 貼ったまま入浴されると強い刺激を感じるため、入浴30分～1時間前にはがしておはいりください。また、入浴直後の貼付はさけてください。

〔成分・分量〕

膏体100g中に次の成分を含んでいます。

成 分	含 量
サリチル酸メチル	7.17g
dl-カンフル	2.51g
l-メントール	3.50g
トコフェロール酢酸エステル	1.00g
ノナン酸バニリラミド	0.02g

添加物としてエヌテルガム、黄色三二酸化鉄、黒酸化鉄、輕質無水ケイ酸、酸化亜鉛、三二酸化鉄、脂環族飽和炭化水素樹脂、脂肪族炭化水素樹脂、スチレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、生ゴム、BHT、ポリイソブチレン、流動パラフィンを含有します。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)品質保持のため、開封後は袋ごと「保存袋」に入れて保管してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

製造販売元 株式会社大石膏盛堂 佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地
電 話 (0942) 83-2112

受付時間 午前9:00～午後5:00(土、日、祝日を除く)

製造番号

使用期限

〔包装〕

直径2.8cm/枚…168枚入
保存袋付

【貼り方の参考例】 下図を参考に痛みを感じるところを中心に貼ってください。

