

切り口 ----- 手で簡単に開封できます ----- 切り口

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

3ZR703346

消炎鎮痛パップ剤

第3類医薬品

冷感ワールドシップS

特 長

- 消炎鎮痛効果のあるサリチル酸グリコールを配合していますので、打撲(うちみ)、捻挫、筋肉痛などにすぐれた効きめを発揮します。
- 粘着性のある基剤と伸縮性のある不織布を使用していますので、はがれやすい部位にもピッタリとフィットします。

⚠(使用上の注意)

❌してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、色素沈着

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

腰痛、打撲(うちみ)、捻じ、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労

【用法・用量】

ライナーをはがし、1日1～2回患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)患部の皮膚は清潔にし、汗等をよく拭きとってからお貼りください。

【成分・分量】

膏体 100g中に次の成分を含んでいます。

成 分	含 量
サリチル酸グリコール	2.0g
l-メントール	1.0g
トコフェロール酢酸エステル	1.0g

添加物としてエデト酸ナトリウム水和物、カルメロースナトリウム、グリセリン、酸化チタン、セラチン、D-ソルビトール、pH調節剤、ヒマシ油、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸部分中和物、ポリソルベート80、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、その他1成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)品質保持のため、未使用分はこの袋に入れ、開封口のチャックを開けて保管してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

燃 焼 時 刻

海 田 製 薬

製造販売元 **株式会社大石膏盛堂**
佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地

製品についてのお問い合わせは、下記にお願いいたします。
株式会社大石膏盛堂 電話 (0942)83-2112
受付時間 午前9:00～午後5:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

0-1

