

うす型
だから
患部に密着!
ピッタリ
はがれにくい

においが少ないタイプ

インドメタシン1.0%

肩こり・腰痛・筋肉痛に冷感

コーホーパスシップID1.0% 第2類医薬品

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
1. 次の人は使用しないでください
 - (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2)ぜんそくを起こしたことがある人。(3)15歳未満の小児。
 2. 次の部位には使用しないでください
 - (1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。(3)みずむいたむし等又は化膿している患部。
 3. 連続して2週間以上使用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1)医師の治療を受けている人。(2)妊娠又は妊娠していると思われる人。(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。
株式会社大石膏盛堂
電話 (0942) 83-2112
受付時間 午前9:00 ~ 午後5:00(土、日、祝日を除く)

〈実物大〉

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。



MADE IN JAPAN

特 長

- インドメタシンを1.0%配合し、痛みの原因物質の生成を抑えることにより、肩の痛み、腰痛、関節痛(五十肩など)に効果をあらわします。
- 粘着性に優れた基剤と伸縮性のある不織布を使用していますので、はがれやすい部位にもピッタリとフィットします。

● 効能・効果

筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛(五十肩など)、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲(うちみ)、捻挫

● 用法・用量

表面のライナーをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

〈用法・用量に関する注意〉

皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きなことを確かめてから使用してください。

● 成分・分量

膏体100g中に次の成分を含んでいます。

インドメタシン 1.0g トコフェロール酢酸エステル 0.30g
添加物としてアジピン酸ジイソプロピル、エデト酸ナトリウム水和物、l-メントール、カルメロースナトリウム、グリセリン、酸化チタン、ゼラチン、D-ソルビトール、pH調節剤、ヒマシ油、ポリacrylic acid、ポリacrylic acid部分中和物、ポリソルベート80、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、マクロゴール400、その他1成分を含有します。

● 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開封口のチャックを閉めて保管してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製造販売元

株式会社大石膏盛堂

佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地

ここを押してください。



14 cm