

鎮痛消炎テープ剤 Pain Relief Patch

第2類  
医薬品

開け口

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

## ロキソプロフィンLXテープα

## 特長

- すぐれた鎮痛消炎効果のあるロキソプロフェンナトリウム水和物を8.1%配合。
- ロキソプロフェンナトリウム水和物が皮膚から吸収され、変化した活性体が直接痛みに効きます。

## △ 使用上の注意

## ☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 1.次の人は使用しないでください
  - (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用し、ぜんそくを起こしたことがある人。
  - (3)15歳未満の小児。
- 2.次の部位には使用しないでください
  - (1)目の周囲、粘膜等。
  - (2)しっしん、かぶれ、傷口。
  - (3)みずむし、たむし等又は化膿している患部。
- 3.本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないでください
- 4.連続して2週間以上使用しないでください(本剤は痛みを一時的におさえるものです。痛み等の症状が継続する場合には、使用を中止し、医師の診療を受けてください)

☆

## 相談すること

- 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1)医師の治療を受けている人。
  - (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (3)妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (4)高齢者
  - (5)次の診断を受けた人  
気管支ぜんそく
- 2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ビリビリ感、かぶれ、水疱、あざができる、色素沈着
消化器	胃部不快感、みぞおちの痛み
その他	むくみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

- | 症状の名称              | 症状   |
|--------------------|--|
| ショック<br>(アナフィラキシー) | 使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。 |
- 3.使用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
下痢、軟便
  - 4.5～6日間使用しても症状がよくなるない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください(他の疾患の可能性がります)

肩の痛み

腰痛

関節痛

関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)

## 用法・用量

表面のライナーをはがし、1日1回患部に貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)本剤は、痛みやはれなどの原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれなどの症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。
- (3)1日あたり4枚を超えて使用しないでください。
- (4)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとってから使用してください。
- (5)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

成分・分量 膏体100g中に次の成分を含んでいます。

ロキソプロフェンナトリウム水和物	8.1g(無水物として7.14g)
l-メントール	3.5g
トコフェロール酢酸エステル	2.3g

添加物として脂環族飽和炭化水素樹脂、水添ロジングリセリンエステル、ステレン・イソブレン・ステレンブロック共重合体、ポリイソブチレン、流動パラフィン、その他1成分  
[1枚あたり(7cm×10cm)]

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開封口のチャックを閉めて保管してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はなるべくすみやかに使用してください。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

7cm

10cm



MADE IN JAPAN

ミツクス  
パッケージ  
FSC® C009890

製造販売元 株式会社大石膏盛堂 佐賀県鳥栖市本町1丁目933番地

製品についてのお問い合わせは、お買い求めの  
お店、または下記にお願いたします。  
株式会社大石膏盛堂 電話 (0942)83-2112  
受付時間 午前9:00～午後5:00(土、日、祝日を除く)