

特長

- 鎮痛・消炎作用を有するサリチル酸グリコール、L-メントールに、患部の血行を良くするトコフェロール酢酸エステルを配合し、肩こり、腰痛などにすぐれた効きめを発揮します。
- 柔軟性のある基布を使用していますので貼りやすく、粘着性にすぐれ関節部などにもよくフィットします。

△【使用上の注意】

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の部位には使用しないでください

- (1)目の周囲、粘膜等。
- (2)湿疹、かぶれ、傷口。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

腰痛、打撲(うちみ)、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労

用法・用量

表面のライナーをはがし、1日1~2回、患部に貼付してください。

<用法・用量に関する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (3) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとってから使用してください。
- (4) 皮膚の特に弱い人は、同じところに続けて貼らないでください。

成分・分量

膏体100g中に次の成分を含んでいます。
サリチル酸グリコール 8.0g
L-メントール 5.0g
トコフェロール酢酸エステル 0.5g
添加物として脂環族飽和炭化水素樹脂、スチレン・イソブレン・ステレンブロック共重合体、ポリイソブチレン、流動パラフィン、その他1成分

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない温湿度の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開封口のチャックを閉めて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はなるべくすみやかに使用してください。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

株式会社大石膏盛堂 電話(0942)83-2112
受付時間 午前9:00~午後5:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

株式会社 大石膏盛堂

佐賀県鳥栖市本町一丁目933番地

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931



<実物大>

10 cm