

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第3類医薬品

# コーホーパス SG テープ



## 【特長】

- 鎮痛・消炎作用を有するサリチル酸グリコール、*l*-メントールに、患部の血行を良くするトコフェロール酢酸エステルを配合し、肩こり、腰痛などにすぐれた効きめを発揮します。
- 柔軟性のある基布を使用していますので貼りやすく、粘着性にすぐれ関節部などにもよくフィットします。

### ⚠️（使用上の注意）

#### ❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。



#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
薬などにアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 【効能・効果】

腰痛、打撲（うちみ）、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労

## 【用法・用量】

表面のライナーをはがし、1日1～2回、患部に貼付してください。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (3) 汗をかいたり、患部がめれている時は、よく拭きとってから使用してください。
- (4) 皮膚の特に弱い人は、同じところに続けて貼らないでください。

### 成分・分量 膏体100g中に次の成分を含んでいます。

サリチル酸グリコール ..... 8.0g  
*l*-メントール ..... 5.0g  
 トコフェロール酢酸エステル ..... 0.5g  
 添加物として 脂環族飽和炭化水素樹脂、スチレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、ポリイソブチレン、流動パラフィン、その他1成分

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になつたり品質が変わります）
- (4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開封口のチャックを閉めて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はなるべくすみやかに使用してください。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

株式会社大石膏盛堂

電話 (0942) 83-2112

受付時間 午前 9:00～午後 5:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元 **株式会社大石膏盛堂**  
佐賀県鳥栖市本町一丁目933番地

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931



〈実物大〉