

開封後はチャックを閉めて保管してください。

[日本薬局方 フェルビナクテープ]
販売名:ナボリン フェルビナク70

ご使用に際して、この袋の説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類
医薬品

ナボリン® フェルビナク70

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が
起こりやすくなる]

1. 次の人は使用しないでください。

(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・
発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人

(2) ぜんそくを起こしたことがある人

(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人

2. 次の部位には使用しないでください。

(1) 目の周囲、粘膜等

(2) 湿疹、かぶれ、傷口

(3) みずむし、たむし等又は化膿している患部

3. 連続して2週間以上使用しないでください。

👨‍⚕️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者
に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人

(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の
可能性があるため、直ちに使用を中止し、この袋
を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して
ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、ヒリヒリ感、かぶれ等

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、 声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦 しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は
使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は
登録販売者に相談してください。

用法・用量

年齢	使用方法
15歳以上	1日2回を限度として患部に貼付する。
15歳未満	使用しないこと

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 定められた用法・用量を遵守してください。
- (2) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのでは
なく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある
場合だけ使用してください。
- (3) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm
角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ
等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (4) 患部が汗等でぬれているときは、よくふき取ってから使用して
ください。
- (5) 15歳未満の小児には使用しないでください。

成分(膏体100g中)

成分	含量	働き
フェルビナク	5.0g	炎症を抑え、痛みをやわらげます。

添加物として、ゴムラテックス、ジイソプロパノールアミン、BHT、
1-メントール、流動パラフィン、SBR合成ラテックス、オレイン酸
ソルビタン、クロタミトン、1,3-ブチレンジグリコール、ポリブテン、
メタクリル酸・アクリル酸ブチルコポリマーを含有します。

[1枚あたり(10cm×14cm)フェルビナク70mg含有]

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
また、本容器内に他の薬剤等を入れないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 未使用分は袋のチャックをしっかりと閉めて保管して
ください。
- (5) 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

製造販売元

救急薬品工業株式会社
富山県射水市戸破32-7

発売元

エーザイ株式会社
東京都文京区小石川4-6-10

本品に関するお問い合わせは、
エーザイ「hhcホットライン」へ ☎ 0120-161-454

nabolin.com

効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎
(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘
など)、打撲、捻挫