

- はがれにくい
- 目立たない
- 伸縮性自在

肩こり

筋肉痛

腰痛

自然な肌色タイプ

消炎鎮痛 plaster 剤

サリエスタース

10枚入

第3類医薬品

7cm×10cm

背割れ付



富士薬品

セルフメディケーション

税 控除 対象

配置用



ご使用後はチャックの端から強く押えて閉めてください。

キリトリせん



ご使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また必要ときに読めるよう保管してください。

うちみ・ねんざ・肩こり・
腰痛・筋肉痛・筋肉疲労

第3類医薬品

消炎・鎮痛プラスター剤

サリエスタエース

- ・サリエスタエースは貼った時に冷や〜っとしない、消炎・鎮痛に優れた効果を発揮するプラスター剤です。
- ・タテ・ヨコ・ナナメに伸縮自在の高密度織布を使い、関節部位にもぴったりフィットします。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本品によりかぶれ等を起こしたことがある人。

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

3.5〜6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【成分・分量】

本品の膏体100g(10000cm²)中
 サリチル酸グリコール … 3.0g /-メントール … 6.0g
 ノニル酸ワニリルアミド … 0.01g

添加物として流動パラフィン、ポリブテン、メタクリル酸・アクリル酸ブチルコポリマー、
 ゴムラテックス、SBR合成ラテックス、BHT、ポリソルベート80を含有します。

【効能・効果】

打撲、捻挫、肩こり、腰痛、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ

【用法・用量】

薬面の剥離紙をはがし、1日1〜3回患部に貼ってください。

《用法・用量に関する注意》

- (1)用法・用量を遵守してください。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。(4)打撲、捻挫の場合には、ハレや熱がひいてから使用してください。(5)はがした直後に入浴すると、熱感で痛みを感じることもありますので、最低30分前にはがしてください。(6)汗をかいたり、皮膚がぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない、涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)(4)未使用分は袋のチャックをしっかりと閉めて保管してください。(5)配置期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製造販売元

救急薬品工業株式会社
富山県射水市戸破32-7お問い合わせ先：お客様相談窓口
電話番号 0766-56-9901

発売元 株式会社富士薬品

埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



(01)14987524904317(93)2704

N22E



セルフメディケーション

税 控除 対象

配置期限

製造番号