

(切り取り線)



経皮吸収型鎮痛消炎剤

スキルフIDS

第2類医薬品

6枚入 (10cm×14cm)

特 長

- 1 インドメタシン配合によるすぐれた鎮痛・消炎効果を発揮
インドメタシンが直接患部に浸透し、痛みの原因となる物質の生成を抑えます。
- 2 関節部位にもピッタリフィット
伸縮性に富んだ不織布を使用し、関節部でもはがれにくい。
- 3 微香性でさわやか
気になるにおいを抑えた微香性で人前でも安心です。

■表面の透明フィルムのはがし方

患部にはる前に、表面の透明フィルムをはがしてください。
フィルム面を手前にして、親指と人差指ではさんで持ってください。
2本の指をすり合わせると、フィルム面が薬剤から離れますので、つまんで
はがしてください。

ここをつまんではがします。



使用期限

製造番号

ご使用前にこの説明文書を必ずお読みください。また必要なときに読めるよう保管してください。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 次の人は使用しないでください。
 - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - ぜんそくを起こしたことがある人。
 - 15歳未満の小児。
- 次の部位には使用しないでください。
 - 目の周囲、粘膜等。
 - 湿疹、かぶれ、傷口。
 - みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- 連続して2週間以上使用しないでください。



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感、皮下出血

- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

【用法・用量】

年 齢	用法・用量
15歳以上	1日2回を限度として患部に貼付してください。
15歳未満	使用しないでください。

【用法・用量に関連する注意】

(1)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。(2)定められた用法・用量を遵守してください。(3)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。(4)患部が汗等でぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。

【成分・分量】 100g (1000cm²)中

成 分	分 量	はたらき
インドメタシン	0.5g	患部の痛みの原因となる物質の生成を抑え、鎮痛消炎効果をあらわします。

添加物として、オレイン酸ソルビタン、ポリソルベート80、ミリスチン酸イソプロピル、ゼラチン、カオリン、トメントール、メタリン酸Na、1,3-ブチレンジリコール、アクリル酸テンブ、ポリアクリル酸部分中和物、メタクリル酸・アクリル酸ブチルコポリマー、D-ソルビトール、pH調整剤、酸化チタン、水酸化Al/Mg、BHTを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)(4)未使用分は袋の口を折りまげて、外気にふれないように保管してください。(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

副作用救済制度
TEL 0120-149-931

MT13H

製造販売元 **救急薬品工業株式会社**

〒939-0351 富山県射水市戸破32-7

お問い合わせ先：お客様相談窓口
電話番号 0766-56-9901

