

切り取り線

消炎・鎮痛パップ剤

スキルフクールA

第3類医薬品

6枚入(10cm×14cm)

殿

年 月 日

使用期限

製造番号

ご使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また必要ときに読めるよう保管してください。

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください。
 - (1) 目の周囲、粘膜等。
 - (2) 湿疹、かぶれ、傷口。

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) 本品によりかぶれ等を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔成分・分量〕本品の膏体100g中

サリチル酸グリコール	0.5g
ℓ-メントール	0.3g
dℓ-カンフル	0.2g
ハッカ油	0.2g
グリチルリチン酸二カリウム	0.02g
添加物としてカオリン、酸化チタン、セラチン、D-ソルビトール、メタクリル酸・アクリル酸ブチルコポリマー、アクリル酸デンプン、1,3-ブチレングリコール、ポリアクリル酸部分中和物、水酸化Al/Mg、ポリソルベート80、オレイン酸ソルビタン、pH調整剤、メタリン酸Na、チモールを含有します。	

〔効能・効果〕

打撲、ねんざ、腰痛、肩こり、筋肉痛、筋肉疲労、関節痛、しもやけ

〔用法・用量〕

薬面のフィルムをはがし、1日1～3回患部に貼ってください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を遵守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 汗をかいたり、皮膚がぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない、涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4) 使用後は袋の切り口を折り曲げて、外気にふれないように保存してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

副作用救済制度
TEL 0120-149-931

MT23A

製造販売元 **救急薬品工業株式会社** お問い合わせ先：お客様相談窓口
富山県射水市戸破32-7 電話番号 0766-56-9901

