



鎮痛消炎温感パップ剤

スキルフホットα

第3類医薬品

6枚入 (10cm×14cm)


特 長

- 1 鎮痛消炎効果のあるサリチル酸グリコールと温感作用をあわせもった鎮痛消炎温感パップ剤です。
- 2 有効成分(サリチル酸グリコール、トウガラシエキス)の働きで、腰痛、肩こり、関節痛などの慢性疾患の症状を改善します。
- 3 粘着性のすぐれた基剤と伸縮性の高い不織布を使用していますので、患部の肌にピッタリとフィットします。
- 4 ヒトの肌に近い弱酸性なので、肌に穏やかです。

■表面の透明フィルムのはがし方

患部に貼る前に、表面の透明フィルムをはがしてください。
フィルム面を手前にして、親指と人差指ではさんで持ってください。
2本の指をすり合わせると、フィルム面が薬剤から離れますので、つまんで
はがしてください。

ここをつまんではがします。



使用期限

製造番号

ご使用の前にこの説明文書を必ずお読みください。また必要なときに読めるよう保管してください。

△ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください。

- (1)目の周囲、粘膜等。
- (2)湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)本品によりかぶれ等を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

腰痛、打撲(うちみ)、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労

【用法・用量】

薬面のフィルムをはがし、1日1～3回患部に貼ってください。

《用法・用量に関連する注意》

- (1)用法・用量を遵守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (4)打撲、捻挫の場合には、ハレや熱がひいてから使用してください。
- (5)はがした直後に入浴すると、熱感で痛みを感じることがありますので、最低30分前にはがしてください。
- (6)汗をかいたり、皮膚がめれているときは、よく拭き取ってから使用してください。

【成分・分量】本品の膏体100g中

サリチル酸グリコール	2.0g
トウガラシエキス	0.025g
(原生薬換算量1.25g)	

添加物として、D-ソルビトール液、ポリアクリル酸部分中和物、ヒマシ油、1,3-ブチレングリコール、メタクリル酸・アクリル酸n-ブチルコポリマー、カルメロースNa、BHT、ゼラチン、pH調節剤、ポリソルベート80、酸化チタン、メタリン酸Na、乾燥水酸化Alゲル、チモールを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない、涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)使用後は袋の切り口を折り曲げて、外気にふれないように保管してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

副作用救済制度
TEL 0120-149-931

MT23I

製造販売元 **救急薬品工業株式会社**

〒939-0351 富山県射水市戸破32-7

お問い合わせ先：お客様相談窓口
電話番号 0766-56-9901

