

〔効能効果〕

- 虫さされ、虫さされによるかゆみ
○気付け

〔用法用量〕

5～10倍に希釈して患部に軽く塗ってください。
気付けには、かるく臭いをかがせてください。

＜用法用量に関連する注意＞

- (1)用法用量を厳守してください。
- (2)局所刺激作用があるので、患部に軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して患部に貼付しないでください。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (5)外用にのみ使用してください。

〔成分分量〕 1 mL中

日局アンモニア水 1 mL含有。

[アンモニア (NH₃) 9.5～10.5 w/v%を含有。]

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない涼しい所（30℃以下）に密栓して保管してください。（揮発性の有効成分を含有しています。）
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

＜貯法＞

気密容器。30℃以下で保存。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

虫さされ用薬

第3類医薬品

日本薬局方

アンモニア水

Ammonia Water

500 mL



健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626

虫さされ、気付けに

使用に際しては、説明書きをよく読んで下さい。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

- (1)目の周囲、粘膜（口唇等）
- (2)傷口、ただれ、かぶれ

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3)湿潤やただれのひどい人。

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症状 |
|------|------------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ、はれ、灼熱感 |

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

製造
番号
使用
期限



4 987286 307565



キャップ:PP
バックン:PE,PP
中 栓:PE
ボトル:PE

30