

外用湿疹・皮膚炎用薬

第3類医薬品

新レスタミンユーワ軟膏

この外箱は、使用の際にはよく読み、
大切に保管してください。



●使用上の注意 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を
起こしたことがある人。(3) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、
直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売
者に相談してください
皮膚：発疹・発赤、かゆみ、はれ
3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この
外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

●成分・分量(1g中)

ジフェンヒドラミン塩酸塩 …………… 20mg [かゆみを抑える]

[添加物] ワセリン、流動パラフィン、セタノール、ステアリルアルコール、
グリセリン、ミリスチン酸オクチルドデシル、カルボキシビニルポリマー、
キサントガム、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート60、
ステアリン酸ソルビタン、エデト酸Na、パラベン、クエン酸、水酸化Na

●効能・効果

湿疹、皮膚炎、かゆみ、かぶれ、あせも、ただれ、しもやけ、虫さされ、じんましん

●用法・用量

1日数回患部に適量を塗布してください。
(用法・用量に関連する注意) (1) 用法・用量を守ってください。(2) 小児に
使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、
すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼
科医の診療を受けてください。(4) 外用にのみ使用してください。



やわらかい乳剤性軟膏
のため、チューブを軽く
押して適量を取り出し、
お使いください。

※使用後はチューブの口元をきれい
にふきとり、乳剤性軟膏がまわりに
付着しないように注意してください。
※使用後は必ずキャップをしっか
りしめてください。

●保管及び取扱い上の注意

(1) 高温をさげ、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して
保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してく
ださい。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原
因になったり品質が変わります。)(4) 使用期限(外箱及び
チューブに記載)をすぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先 興和株式会社 お客様相談センター
TEL03-3279-7755 月～金(祝日を除く)9:00～17:00

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931



セルフメディケーション
税 控除 対象

T1438
O2K
0000

製造 興和株式会社 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
販売元

のびやすく、塗りやすい乳剤性軟膏

外用湿疹・
皮膚炎用薬**新レスタミンユーワ軟膏**

湿疹や皮膚炎、かゆみなどの治療には、皮膚科領域を中心に外用のジフェンヒドラミン製剤が使用されています。

新レスタミンユーワ軟膏には、有効成分であるジフェンヒドラミン塩酸塩が、OTC医薬品としての配合上限量である2.0%処方されています。ジフェンヒドラミン塩酸塩は、かゆみなどのもとであるヒスタミンの働きをおさえて、かゆみをおさえると同時に、湿疹や皮膚炎などにすぐれた効きめをあらわします。

本剤は、やわらかくのびやすい乳剤性軟膏で、かゆみなどの広い患部にも塗り広げやすく、使用感のよいお薬です。また、無香料・無着色・非ステロイドで、お子様からご使用いただけます。

湿疹や皮膚炎などは、掻くことによって悪化してしまうこともあります。本剤をご家庭に常備して、皮膚がかゆくなったり、赤いポツポツ、ブツブツなどの症状が出たら早めにご使用ください。

⚠ 使用上の注意**相談すること**

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 湿潤やただれのひどい人。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

成分・分量(1g中)

成分・分量	働 き
ジフェンヒドラミン塩酸塩 20mg	湿疹やかゆみ等のもとになるヒスタミンの働きをおさえ、湿疹やかゆみ等にすぐれた効きめがあります。

[添加物]ワセリン、流動パラフィン、セタノール、ステアリルアルコール、グリセリン、ミリスチン酸オクチルドデシル、カルボキシビニルポリマー、キサンタンガム、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート60、ステアリン酸ソルビタン、エデト酸Na、パラベン、クエン酸、水酸化Na

効能・効果

湿疹、皮膚炎、かゆみ、かぶれ、あせも、ただれ、しもやけ、虫さされ、じんましん




用法・用量

1日数回患部に適量を塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- ①用法・用量を守ってください。
- ②小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- ③目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- ④外用にのみ使用してください。

●容器の使い方

		
1.まずキャップをはずして、キャップ上部の突起部でチューブの出し口(アルミシール)にしっかり穴をあけてください。	2.やわらかい乳剤性軟膏のため、チューブを軽く押して適量を取り出し、お使いください。	3.使用後は必ずキャップをしっかりしめてください。

※使用後はチューブの口元をきれいに拭きとり、乳剤性軟膏がまわりに付着しないように注意してください。

※チューブを折り曲げたり、折りたたんだりしないでください。
(チューブが破れる原因となります。)

保管及び取扱い上の注意

- ①高温をさけ、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- ②小児の手の届かない所に保管してください。
- ③他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- ④使用期限(外箱及びチューブに記載)をすぎた製品は使用しないでください。


本製品に関するお問い合わせ

お買い求めのお店又は下記へお願いします。

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センター

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
受付時間:月～金(祝日を除く)9:00～17:00

製造販売元

 興和株式会社

〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14