

鎮痒消炎薬

第3類医薬品

レスタミン[®]ユー[®]パウダー[®]クリーム



この外箱は、使用の際にはよく読み、大切に保管してください。

●使用上の注意 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
皮膚：発疹・発赤、かゆみ、はれ
3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

●成分・分量(1g中)

ジフェンヒドラミン塩酸塩……………20mg [かゆみを抑える]
酸化亜鉛……………100mg [かぶれた皮膚を保護する]
グリチルレチン酸……………1mg [皮膚の炎症を鎮める]

[添加物] 無水ケイ酸、ヒドロキシエチルセルロース、セタノール、ステアリン酸、ミリスチン酸オクチルドデシル、流動パラフィン、ジメチルポリシロキサン、ステアリン酸ポリオキシル、ポリソルベート20、オレイン酸ソルビタン、パラベン、クエン酸、香料、エタノール

●効能・効果

あせも、かぶれ、湿疹、かゆみ、ただれ、皮膚炎、しもやけ、虫さされ、じんましん

●用法・用量

1日数回適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉(1) 用法・用量を守ってください。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4) 外用にのみ使用してください。



●保管及び取扱い上の注意

(1) 高温をさけ、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4) 使用期限(外箱及びチューブに記載)をすぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先 興和株式会社 お客様相談センター
TEL03-3279-7755 月～金(祝日を除く)9:00～17:00

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

セルフメディケーション

税 控除 対象

製造 興和株式会社 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
販売元

T1702
A2K