

虫さされ・かゆみ治療薬

**ウナ、エースL**

ウナ、エースLは、強い炎症や激しいかゆみをとまう、ダニ、毛虫、ムカデなどの虫さされにもしっかり効く、液体タイプのかゆみ治療薬です。

**製品特長**

- 抗炎症成分PVA(プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル)、局所麻酔成分リドカイン塩酸塩、かゆみ止め成分ジフェンヒドラミン塩酸塩の3成分を配合した『トリプル処方』で、かゆみをすばやく抑え、効果的に炎症・はれを鎮めます。
- 蚊だけでなく、ダニ、ノミ、毛虫、ムカデなどの害虫や、クラゲにさされ、しつこいかゆみや炎症をとまう患部にもお使いいただけます。
- 先端がスポンジになっているので、直接患部に塗布でき、手を汚しません。

**すぐれた抗炎症成分PVA配合**

PVA(プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル)は炎症やはれにすぐれた効果を示すアンテドラッグ型ステロイド成分です。

**アンテドラッグとは**

患部ですぐれた効果を発揮し、体内では分解され作用がおだやかになる成分で、有効性と安全性を考えて設計された薬剤です。

**⚠ 使用上の注意****❌ してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

**① 次の部位には使用しないでください**

- (1)水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- (2)創傷面。
- (3)目や目の周囲、粘膜等。

**② 顔面には、広範囲に使用しないでください****③ 長期連用しないでください****🗨️ 相談すること****① 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4)患部が広範囲の人。
- (5)湿潤やただれのひどい人。

**② 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

**③ 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください****成分・分量(1mL中)**

成分・分量	働 き
プレドニゾロン 吉草酸エステル 酢酸エステル(PVA) 1.5mg	炎症患部でよく効き、体内では分解され作用がおだやかになるアンテドラッグ型ステロイド成分で、炎症によるはれや赤みをしっかり抑えます。
リドカイン塩酸塩 10.0mg	局所麻酔作用により、かゆみの伝わりを止め、かゆみを鎮めます。
ジフェンヒドラミン 塩酸塩 20.0mg	湿疹やかゆみ等のもととなるヒスタミンの働きを抑え、かゆみを鎮めます。
l-メントール 35.0mg	患部に清涼感を与え、かゆみをやわらげます。
dI-カンフル 10.0mg	

〔添加物〕ラウロマクロゴール、エデト酸Na、エタノール

(裏面へ続く)

## 効能・効果

虫さされ、かゆみ、湿疹、かぶれ、皮膚炎、あせも、じんましん


## 用法・用量

1日数回適量を患部に塗布してください。

### <用法・用量に関連する注意>

- ①用法・用量を守ってください。
- ②小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- ③目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- ④外用にのみ使用してください。
- ⑤薬剤塗布後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。また、ひざの裏やひじの内側等に使用する場合は、皮膚を密着(正座等)させないでください。

### 容器の使い方



※使用感がよく、破れにくいスポンジ素材を使用していますが、液がスポンジ面に充分浸透していないと、スポンジ面が破れるおそれがありますので、注意してください。

## 保管及び取扱い上の注意

- ①高温をさけ、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- ②小児の手の届かない所に保管してください。
- ③他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- ④本剤のついた手で、目など粘膜に触れないでください。
- ⑤容器が変形するおそれがありますので、車の中など、高温になる場所に放置しないでください。容器の変形により、スポンジ部分の脱落や、液もれがおこるおそれがありますので注意してください。
- ⑥本剤が衣類や寝具などに付着し、汚れた場合にはなるべく早く水か洗剤で洗い落としてください。
- ⑦メガネ、時計、アクセサリーなどの金属類、衣類、プラスチック類、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- ⑧火気に近づけないでください。
- ⑨使用期限(外箱及び容器に記載)をすぎた製品は使用しないでください。



- ハチなどに刺された際に、広範囲のむくみやはれ、息苦しさ、吐き気、下痢、発熱などの症状がみられるときは、直ちに医師の診療を受けてください。
- 症状がひどい場合や患部が広範囲なときは、本剤では対処できないことがあります。その場合は医師の診療を受けてください。

### 本製品に関するお問い合わせ

お買い求めのお店又は下記へお願いします。

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センター

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566  
受付時間：月～金(祝日を除く)9:00～17:00

●興和製品サイト <https://hc.kowa.co.jp/otc>



製造販売元 興和株式会社

〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14