

使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

かゆみ・虫さされ・肩のこり・筋肉痛

第2類医薬品

クミチール



使用上の注意

× してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないこと

- (1) 目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 乳幼児
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 患部が顔面又は広範囲の人
- (5) 患部が化膿している人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成分・分量 (100g中)

サリチル酸メチル…3.5g d-カンフル………6.0g グリチルリチン酸…0.1g
l-メントール………2.5g フェノール…………1.0g
ハッカ油……………1.5g ジフェンヒドラミン ……1.0g
添加物として、ステアリン酸*、パラフィン*、ステアリルアルコール、ポリオキシエチレンソルビットミツロウ*、ミリスト酸イソプロピル*、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、トリエタノールアミン*、水酸化K*、精製水*を含有する。

効能・効果

虫さされ、皮膚そう痒症、かゆみ止め、肩のこり、足腰の痛み、筋肉の痛みやはれ、うちみ、ねんざ、運動後の疼痛

用法・用量

1日数回小豆大を患部にすりこんでください。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用されること。
- (3) 外用にのみ使用すること。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当らない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 配置期限を過ぎた製品は使用しないこと。なお、配置期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く使用すること。

お問い合わせ先 国産薬品工業株式会社 お客様相談室

☎ 0120-313-430

受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

発 売 元 厚生連

製造販売元 国産薬品工業株式会社

岐阜市秋沢370番2