

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。また必要ときに読めるよう大切に保管してください
使用期限(パッケージ底面および容器底面に記載)を過ぎた製品は使用しないこと

カサカサ肌のかゆみに | ラナケイン[®]クリーム

販売名:ラナケインクリーム

鎮痒消炎薬 **第2類医薬品**

製品特徴

ラナケインクリームは、スースーしめないかゆみどめです
こんなかゆみにお使いください



カサカサ肌

おフロあがりに
手足がかサついてかゆい

寝床に入ってから
背中がかゆい



下着のしめつけ



繊維刺激

1. しめないかゆみ止めなので、顔^(※) やかきむ
しったところ等様々な場所に使えます
2. 局所麻酔剤を2%配合し、塗ったそばから
かゆみを抑えます
3. 新陳代謝促進成分を配合、皮ふの生理機能を
改善していきます
4. のびのよいクリームなので、広い範囲にも
塗りやすくべたつきません
5. ステロイド成分は入っていません

(※)目の周囲、粘膜(例えば、口唇等)には使用しないでください

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと：目の周囲、粘膜など



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者
に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたこ
とがある人
(3) 湿潤やただれのひどい人
(4) 乳幼児
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があ
るので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤
師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止
し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談
すること

効能・効果

かゆみ、かぶれ、湿疹、虫さされ、皮ふ炎、じんましん、あせも、ただれ、しもやけ

(裏面につづく)

用法・用量

1日数回、患部に適量を塗布してください

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- (2) 目に入らないように注意すること
万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
- (3) 外用にのみ使用すること
- (4) 同じ部位に他の外用剤との併用は避けること
- (5) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないこと

成分・分量

100g 中

成分	分量	はたらき
ジフェンヒドラミン	1.0g	(抗ヒスタミン剤) かゆみの発生を抑えます
リドカイン	2.0g	(局所麻酔剤) 知覚神経を麻痺させ、 かゆみを緩和します
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	(殺菌剤) 患部周辺の雑菌の発生を 抑えます
トコフェロール酢酸エステル	0.3g	(ビタミンE) 新陳代謝を高め、 皮ふの生理機能を改善します

添加物として、流動パラフィン、カルボキシビニルポリマー、D-ソルビトール液(70%)、ミリスチン酸イソプロピル、スクワラン、モノステアリン酸ポリエチレングリコール、パラベン、モノステアリン酸グリセリン、セトステアリルアルコール、ポリオキシエチレンセトステアリルエーテル、ステアリルアルコール、セタノール、ジメチルポリシロキサン、トリエタノールアミン、エト酸 Na を含有する

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところにキャップをしっかりとめて保管すること
- (2) 小児の手の届かないところに保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

製品のお問合せは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします



発売元

小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製品のお問合せ先(お客様相談室)

☎0120-5884-01

受付時間9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

ホームページ|<http://www.kobayashi.co.jp>

製造販売元

小林製薬株式会社

〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

MADE IN JAPAN

10125197