⚠使用上の注意

☒してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)**1.次の人は使用しないこと**(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人(2)ぜんそくを起こしたことがある人(3)妊婦又は妊娠していると思われる人(4)15才未満の小児 **2.次の部位には使用しないこと**(1)目の周囲、粘膜等(2)湿疹、かぶれ、傷口(3)みずむし・たむし等又は化膿している患部 **3.長期連用しないこと**



相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること(1)医師の治療を受けている人 (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症　状
皮　ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあるその場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症　状
ショック(アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

火気厳禁
第一石油類
危険等級Ⅱ
エタノール含有物

第2類医薬品 外用鎮痛消炎剤

販売名:コムレケア　ヨコヨコ

External Anti-Inflammatory / Analgesic

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください。また必要なときに読めるよう大切に保管してください

【成分・分量】100g中

フェルビナク……3g
トコフェロール酢酸エステル…0.5g
l-メントール……6g
添加物として、ジイソプロパノールアミン、アジピン酸ジイソプロピル、ミリスチン酸イソプロピル、BHT、プロピレングリコール、硫酸Mg、エタノールを含有する

【用法・用量】

1日2~4回、適量を患部に塗布してください
〈用法・用量に関連する注意〉(1)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること(2)外用にのみ使用すること●塗布部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないこと●皮ふの特に弱い方は、同じ所に続けて使用しないこと●ヒリヒリとした刺激が強い場合は、石けんで洗い流すと緩和します

【効能・効果】

筋肉痛、捻挫、関節痛、腰痛、腱鞘炎（手・手首・足首の痛みと腫れ）、肘の痛み（テニス肘など）、打撲、肩こりに伴う肩の痛み

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

\あったらいいな／をカタチにする
発売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10
小林製薬 お客様相談室
0120-5884-01
9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

製造販売元 小林製薬株式会社
〒562-0029 大阪府箕面市彩都粟生北4-1-66

特　徴

1. 消炎鎮痛成分フェルビナクが患部に浸透し、足のつりなどの筋肉の痛みを鎮めます
2. 血行促進成分トコフェロール酢酸エステルが、筋肉の収縮による滞った患部の血流を改善します
3. l-メントール6%配合で、爽快な使い心地です
4. ニオイが気にならない無臭性です
5. 手が汚れず使い易い、ヨコヨコボトルです

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所(冷暗所)にキャップをしっかりしめて立てて保管すること(2)小児の手の届かない所に保管すること(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)(4)使用期限をすぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく速やかに使用すること(5)火気に近づけないこと●キャップをしっかりしめないと液がもれることがある●プラスチック製品(眼鏡わく、くし、便座等)、化繊の衣類、木材(塗料塗り家具、床等)、皮革等に液がつくと損耗したり、シミになることがあるので注意すること●衣類に付着した場合には、各衣類の洗濯表示に従って、すみやかに洗うこと

税控除対象

MADE IN JAPAN
10232403