

△ 使用上の注意

✕ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人
- (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (4) 15才未満の小児

2. 次の部位には使用しないこと

- (1) 目の周囲、粘膜等
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口
- (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部

3. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み、ヒリヒリ感、熱感、かぶれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある
その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦し、動悸、意識の混濁等があらわれる

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

特 徴

- ① 鎮痛成分フェルピナクが患部に浸透し、肩こりの痛みを鎮めます
- ② 血行促進成分(ノナン酸パニリルアミド)を配合し、肩こりの痛みを原因*から改善します
※肩こりの痛みの原因の一つである血行不良
- ③ l-メントール6%配合で、爽快な使い心地
- ④ 背中まで届き使いやすいロングボトルです

- [成分・分量] 100mL 中 -

フェルピナク 3g
l-メントール 6g
クロルフェナミンマレイン酸塩 0.1g
ノナン酸パニリルアミド 12mg
添加物として、グリチルレチン酸、プロピレングリコール、ジソプロパノールアミン、pH調整剤、BHT、エタノールを含有する

— 【用法・用量】 —

1日2～4回、適量を患部に塗布してください

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
- (2) 外用にのみ使用すること
- 塗布部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないこと
- 皮膚の特に弱い方は、同じ所に続けて使用しないこと
- スポーツや入浴等、汗をかき前・後に使用した場合、ヒリヒリとした刺激、痛みや熱感が増すことがあります。これらの症状が強い場合は、石けんで洗い流すと緩和します

火気厳禁 第二石油類 危険等級Ⅲ
エタノール含有物

副作用被害救済制度

☎0120-149-931

10234431

あったらいいな
をカタチにする

小林製薬

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください。また必要に応じて使用期を過ぎた製品は使用しないこと

— 【効能・効果】 —

肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所(冷暗所)にキャップをしっかりと立てて保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- キャップをしっかりとめないと液がもれることがある
- 衣類に付着した場合には、各衣類の洗濯表示に従って、すみやかに洗うこと

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

発売元 小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪府中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01

9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社

〒562-0029 大阪府箕面市彩都業生北4-4-66

税 控除 対象

Sample

MADE IN JAPAN

