

治療薬

汗かぶれの かゆみ

荒れ肌


を修復する

▼赤み ▼湿疹 ▼ヒリヒリ



皮ふ炎、かぶれ 第②類医薬品

15g クリーム剤



1 組織修復 抗炎症

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください また必要なときに読めるよう大切に保管してください 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

販売名:アセアキュア Medicine for Prickly Heat

第②類医薬品 鎮痒消炎薬

☆ してはいけないこと
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)1.次の部位には使用しないこと:水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部 2.顔面には、広範囲に使用しないこと 3.長期連用しないこと

相談すること 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相 談すること(1)医師の治療を受けている人(2)妊婦又は妊娠していると思われる人(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人(4)患部が広範囲の人(5)湿潤やただれのひどい人 2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

正し、この相で対して区間、采用即又は豆螺般が甘口		
	関係部位	症状
	皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ
	皮ふ(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、 化膿症状、持続的な刺激感

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱 を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

|効能・効果|| 湿疹、皮ふ炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん

成分分量 100g中 プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル 0.15g、ジフェンヒドラミン塩酸塩 2.0g、アラントイン 0.2g、イソプロピルメチルフェノール 0.1g、リドカイン 2.0g、l-メントール 3.5g、トコフェロール ・ 酢酸エステル 2.0 g

添加物として、1,3-ブチレングリコール、セトステアリルアルコール、トリイソオクタン酸グリセリン、流動パラフィン、ジメチルポリシロキサン、BHT、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ステアリン酸ソルビタン、CMC-Na、エデト酸Na、パラベン、クエン酸 Na、pH調節剤、その他2成分を含有する

用法・用量 1日数回、患部に適量を塗布してください

<用法・用量に関連する注意>(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること(2)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること(3)外用にのみ使

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

^{発売元} 小林製薬株式会社 小林製薬 お客様相談室 0120-5884-01

製造販売元 小林製薬株式会社 〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

