

この説明文書は使用前に必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

非ステロイド 鎮痒消炎薬
虫さされ・かゆみ・じんましんに

カアムKゲルス

第2類医薬品

カアムKゲルスは、蚊・はち・あり・毛虫などの虫さされに伴うかゆみや腫れなどをしずめます。また、じんましんやあせも、しもやけなどのかゆみを伴う不快な皮膚症状の他に、湿疹、皮膚炎、ただれ、かぶれなどにも効果をあらわします。

また、カアムKゲルスは、かゆみや炎症をしずめるジフェンヒドラミン塩酸塩・グリチルレチン酸、かゆみをおさえるジブカイン塩酸塩をはじめ、清涼感のあるdl-カンフル・l-メントールを配合した非ステロイドのお薬で、べたつかない透明なゲルクリームです。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 湿潤やただれのひどい人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効 能】

虫さされ、かゆみ、しもやけ、じんましん、湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ

【成分・分量】 100g中

成分名	分量	作 用
ジフェンヒドラミン塩酸塩	2.0 g	湿疹やかゆみを起こす原因物質のヒスタミンの作用をおさえます。
ジブカイン塩酸塩	0.3 g	局所麻酔作用でかゆみを一時的におさえます。
グリチルレチン酸	0.3 g	かゆみや炎症をしずめます。
l-メントール	5.0 g	患部に清涼感をあたえ、かゆみをやわらげます。
dl-カンフル	3.0 g	

添加物：ヒドロキシプロピルセルロース、マクロゴール、プロピレングリコール、ステアリン酸ポリオキシル、エタノール、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、パラベン

【用法・用量】

1 日数回、適量を患部に塗擦又は塗布してください。

（用法・用量に関連する注意）

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)外用にのみ使用してください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4)本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。
- (5)メガネ、時計、アクセサリ、プラスチック類、化繊製品、皮革製品、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- (6)使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

【手当法・養生法】

- (1)じんましんやかぶれの原因としては、一般に次のようなものがあります。
 - たべものによるもの（えび、かに、さば、卵、チョコレートなど）
 - 植物に接触（うるし、ぎんなんなど）
 - 昆虫の刺傷、噛傷
 - 圧迫や摩擦などによる機械的刺激や温熱、寒冷、日光などによる物理的刺激
- (2)患部を掻くと、いっそう強くはれあがったり細菌感染（化膿）の原因ともなりますので出来る限り掻かないよう注意してください。
- (3)炎症の強いとき（患部に腫れや熱が有る場合）やただれているときは、入浴を控えてください。また、石鹸などの使用も避けた方が良いでしょう。
- (4)香辛料やお酒などの刺激性の食べ物は避けてください。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

小林薬品工業株式会社 お客様相談室

電話 058-278-3933

受付時間：10時～16時（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

☎ 0120-149-931（フリーダイヤル）

製造販売元

小林薬品工業株式会社

岐阜県岐阜市中鶯1丁目139番地

本社所在地 東京都中央区日本橋箱崎町4番6号