



第2類
医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



外用湿疹・皮膚炎用薬

タクトローション[®]

皮膚炎、かゆみ、あせもに

タクトローションは…

- 広範囲に塗りやすく、しかも目立ちません。
(無色～微黄色のさらっとした液体です。)
- 乳幼児や汗っかきの人にできやすいあせもに効果をあらわします。
- 虫さされなどによるかゆみや皮膚炎に効果をあらわします。
- ステロイドが入っていません。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 湿潤やただれのひどい人。



2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

〔効 能〕

あせも、かゆみ、皮膚炎、虫さされ、じんましん、湿疹、かぶれ、ただれ、しもやけ

〔用法・用量〕

1日数回、患部に軽く塗布します。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)外用にのみ使用してください。

〔成分・分量と働き〕100mL中

成分	分量	働き
グリチルリチン酸 二カリウム	0.5g	あせも、虫さされ、皮膚炎などの炎症を鎮めます。
ジフェンヒドラミン 塩酸塩	1.0g	抗ヒスタミン作用により、かゆみやじんましんを抑えます。
テシットデシチン	1.0g	局所麻酔作用により、かゆみを抑えます。
アラントイン	0.2g	あせも、皮膚炎、湿疹などの患部の治りを早めます。
イソプロピル メチルフェノール	0.1g	殺菌作用により、細菌による悪化を防ぎます。

添加物として、エドト酸Na、香料（*l*-メントール）を含有します。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。



◎あせものお手当のアドバイス

- 1.できるだけ汗をかかないようにしましょう。
汗をかかないことが最大の予防法です。
- 2.汗をかいたら清潔なぬれたタオルで皮ふをこすらないようにふきましょ。
- 3.通気性のよい下着を着るようにしましょう。
また、汗をかいたらこまめに下着をかえましょ。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、
お買い求めのお店又は下記にお問い合わせください。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03-5412-7393
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元
佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号