



sato

セルフメディケーションをサポートします HEALTHCARE INNOVATION

2012年12月 記載要領変更に伴う改訂

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

鎮痒消炎薬

セロトピー 軟膏

プレドニゾロン吉草酸エステル
酢酸エステル(PVA)配合

セロトピー軟膏は…

- アンテドラッグステロイドのプレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルを配合し、湿疹・皮膚炎、かぶれに効果をあらわします。
アンテドラッグとは、皮膚表面の患部で効果を示し、体内に吸収されると低活性となる薬剤のことです。
- のびのよい水溶性の軟膏です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください

水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。

2. 顔面には、広範囲に使用しないでください

3. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 患部が広範囲の人。
- (5) 湿潤やただれのひどい人。



2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

〔効 能〕

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん

〔用法・用量〕

1日数回、適量を患部に塗擦します。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (4)外用にのみ使用してください。
- (5)本剤の塗擦後わずかにほてり(熱感)を感じるがありますが、ごく短時間のうちに消失します。
- (6)本剤を塗擦後、使用部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。

〔成分・分量と働き〕

成 分	分量	働 き
プレドニゾン吉草酸エステル 酢酸エステル	0.15%	高い消炎作用により、湿疹・皮膚炎等の炎症を抑えます。
クロタミトン	5%	湿疹・かぶれ等に伴うかゆみを抑えます。
トコフェロール酢酸エステル	0.5%	血行を促進し、治療を助けます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1%	殺菌効果により、患部の感染を防ぎます。

添加物として、マクロゴールを含有します。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口

電話 03(5412)7393

受付時間:9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元

佐藤製薬株式会社

東京都港区元赤坂1丁目5番27号