

しっしん・かゆみ・虫さされに

第2類医薬品

しっしん、皮ふ炎治療薬
シオノギ[®]D軟膏 シオノギヘルスケア

シオノギD軟膏は、副腎皮質ホルモン外用剤で、皮ふの赤み、かゆみにすぐれた効きめを発揮しますが、この種類の外用剤は、長期間*続けて使用しますと、皮ふに悪い影響を与えることがあります。

*使用上の注意 をご参照ください。

……特徴……

- 成分が患部でよく作用するように、吸収されやすい形で軟膏中に配合されているので、しっしん、かゆみ、虫さされなどによく効きます。
- しっしん、かぶれをおこしている皮ふは刺激に敏感になっているといわれています。
シオノギD軟膏は基剤原料にも工夫をしています。
- べとつきが少なく、うすくぬることができます。また軟膏基剤の主成分・ワセリンそのものに保護効果があります。



使用上の注意 ……

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなります)

1. 次の人は使用しないこと

本剤または本剤の成分、クロルヘキシジンによりアレルギー症状をおこしたことがある人

2. 次の部位には使用しないでください

- (1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむしなどまたは化膿している患部
(2) すり傷、切り傷

3. 顔面には、広範囲に使用しないでください

4. 次の場合には使用しないでください

- (1) 美容目的の使用 (2) かぶれ防止のための化粧下、ひげそりあと (3) にきび
(4) 赤ら顔(赤鼻) (5) おむつかぶれ(しっしん以外の原因によることが多い)

5. 長期連用しないでください

- (1) よくなれば中止してください。だらだらと無用に長く使わないでください。
(2) よくなりつつあっても1カ月をこえる場合は中止して医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。
(3) とくに、顔や首まわりに2週間以上の使用はさけてください。もし、それ以上続ける場合には医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

- (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
(3) 薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人
(4) 患部が広範囲の人 (5) 湿潤やただれのひどい人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
皮膚(患部)	みずむし・たむしなどの白せん、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

まれに下記の重篤な症状がおこることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁などがあらわれる

(裏面につづく)

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

…… 効能・効果 ……

しっしん、かゆみ、虫さされ、かぶれ、皮ふ炎、あせも、じんましん、しもやけ

…… 用法・用量 ……

1日1～3回 適量を患部に塗布してください。

<用法・用量に関する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないようにご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用のみに使用し、内服しないでください。
- (5) ごしごしすりこまないで、のばすようにうすくぬってください。
(あつめにぬっても効きめが高まるわけではありません。)
- (6) 始めは1日に2～3回ぬり、よくなるにつれて回数をへらしてください。

…… 成分・分量 ……

シオノギD軟膏は、透明感のあるにおいのない白色の油性軟膏で、1g中に次の4種の成分を含有しています。

成分	含量(1g中)	はたらき
デキサメタゾン酢酸エステル	0.25mg	副腎皮質ホルモンの一つで、炎症をおさえ、かゆみをしずめる
クロルヘキシジン塩酸塩	1mg	細菌の感染を防ぎ、しっしんやかぶれの悪化を防ぐ
グリチルレチン酸	3mg	炎症をしずめ、デキサメタゾン酢酸エステルの抗炎症作用を高める
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)	5mg	血液の流れをよくするほか、炎症の拡大を防ぐ

添加物として 白色ワセリン、流動パラフィン、プロピレングリコール、ソルビタン脂肪酸エステルを含有しています。

…… 保管および取扱い上の注意 ……

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変化します)
- (4) 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。



…… 日常の心がけ(しっしん、皮ふ炎の場合) ……

<p>■衣類</p> <ul style="list-style-type: none"> かゆみをおこすような下着(毛・化繊)をさける。木綿などがよい。 	<p>■刺激</p> <ul style="list-style-type: none"> かきむしらない。 汗、寒冷、日光などの刺激をさける。 	<p>■入浴</p> <ul style="list-style-type: none"> 刺激の少ない良質の石けんで軽く洗う。 ぬるめのお湯に入る。 	<p>■食事</p> <ul style="list-style-type: none"> 香辛料、アルコール飲料などの刺激物をさける。 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

…… お問い合わせ先 ……

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までお願いいたします。
シオノギヘルスケア株式会社「医薬情報センター」
電話: 大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450
受付時間: 9時～17時(土、日、祝日を除く)

「副作用被害救済制度」について
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

®登録商標

製造販売元

シオノギヘルスケア株式会社

大阪府中央区北浜2丁目6番18号