

イハダ プリスクリードD

第2類医薬品

△ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、刺激感(ヒリヒリ感)、熱感、乾燥感

3. 1~2週間くらい使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

本剤にステロイド成分は配合されていません。

〔成分・分量〕(1g中)

ウフェナマート ······ 50mg

トコフェロール酢酸エステル ······ 5mg

添加物として、ミリスチン酸イソプロピル、ジメチルポリシロキサン、ワセリン、マイクロクリスタリンワックス、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、グリセリン、1,3-ブチレングリコール、ヒアルロン酸Na、カルボキシビニルポリマー、エデト酸Na、パラベン、流動パラフィン、水酸化K、マクロゴール

〔適応症〕

皮膚炎、湿疹、かゆみ、かぶれ、ただれ、あせも、おむつかぶれ

〔用法・用量〕

1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 患部を清潔にした後、塗布してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

〔保管および取扱い上の注意〕

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れかえないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。

株式会社 資生堂

東京都中央区銀座7-5-5

お客様窓口 ☎ 0120-81-4710

MADE IN JAPAN

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931