

# IHADA

イハダ プリスクリードD 14mL

第2類医薬品

〔適応症〕

皮膚炎、湿疹、かゆみ、かぶれ、ただれ、あせも、おむつかぶれ

〔成分・分量〕(1g中)

ウフェナマート50mg、トコフェロール酢酸エステル5mg

添加物として、ミリスチン酸イソプロピル、ジメチルポリシロキサン、ワセリン、マイクロクリスタリンワックス、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、グリセリン、1,3-ブチレングリコール、ヒアルロン酸Na、カルボキシビニルポリマー、エデト酸Na、パラベン、流動パラフィン、水酸化K、マクロゴールを含有します。

本剤にステロイド成分は配合されていません。

湿疹・皮膚炎の主な原因：

花粉、日焼け、乾燥、季節の変わり目、大気汚染、植物、ペット、ダニ、合わない化粧品、アクセサリー、衣類、汗、皮脂、生理前、ストレス

〔用法・用量〕 1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉(1)患部を清潔にした後、塗布してください。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4)外用にのみ使用してください。

〔保管及び取扱い上の注意〕(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れかえないでください(誤用の原因になったり、品質が変わる場合があります)。

第2類医薬品

赤み

ぶつぶつ

かゆみ

かぶれ

ただれ

イハダ プリスクリードDは、赤み・ぶつぶつなどに効果を発揮

顔湿疹とは？

顔湿疹とは、常に外気にさらされている顔の目、鼻、口のまわりなどにみられる湿疹です。原因は、花粉、日焼け、大気汚染、汗、皮脂など様々です。治療薬で肌の炎症を鎮めて、早めに治すことをおすすめします。

- 肌の炎症を鎮め、湿疹、皮膚炎、かゆみを治します
- ベタつかず、肌にすとなじむ使い心地です
- 素肌と同じ弱酸性 ○無香料・無着色
- 赤ちゃんにも使えます

2つの  
有効成分

ウフェナマート(炎症を鎮める)  
トコフェロール酢酸エステル(血行促進)

ご使用に際しては、この箱の説明書きを必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

△ 使用上の注意



相談すること


- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1)医師の治療を受けている人 (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3)湿潤やただれのひどい人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症状                             |
|------|--------------------------------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ、はれ、刺激感(ヒリヒリ感)、熱感、乾燥感 |

- 1～2週間くらい使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

# IHADA

治療ケア



## ぶつぶつ 赤みに効く



プリスクリードD(顔・からだ用) 乳幼児にも使えます

ノンステロイド



のびのよい  
エッセンスタイプ

14mL 第2類医薬品

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

1007

発売元 株式会社 資生堂 東京都中央区銀座7-5-5 お客様窓口 ☎ 0120-81-4710  
製造販売元 東亜薬品株式会社 富山県富山市水橋開発277番10 MADE IN JAPAN



49 09978 20451 8

セルフメディケーション  
税 控除 対象



ケース

製造記号

使用期限

