


IHADA

イハダ プリスクリード i 6g



ご使用に際しては、この箱の説明書きを必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

湿疹・皮膚炎の主な原因：

花粉、日焼け、乾燥、季節の変わり目、大気汚染、植物、ペット、ダニ、合わない化粧品、アクセサリ、衣類、汗、皮脂、生理前、ストレス

〔適応症〕 皮膚炎、湿疹、かゆみ、かぶれ、ただれ、あせも、おむつかぶれ

〔成分・分量〕 (1g中) ウフェナマート50mg、ジフェンヒドラミン10mg、グリチルレチン酸3mg

添加物として、流動パラフィン、ワセリン、ジメチルポリシロキサン、ステアリルアルコール、ベヘン酸、1,3-ブチレングリコール、グリセリン、ヒアルロン酸Na、ステアリン酸ポリオキシシル、ステアリン酸グリセリン、水酸化K、パラベン、カルボキシビニルポリマー、キサンタンガムを含有します。

本剤にステロイド成分は配合されていません。

〔用法・用量〕 1日数回、適量を患部に塗布してください。

〔用法・用量に関連する注意〕 (1)患部を清潔にした後、塗布してください。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4)外用にのみ使用してください。

〔保管及び取扱い上の注意〕 (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れかえないでください(誤用の原因になったり、品質が変わる場合があります)。

発売元 株式会社 資生堂 東京都中央区銀座7-5-5

お客さま窓口 ☎ 0120-81-4710

製造販売元 東亜薬品株式会社

富山県富山市水橋開発277番10

MADE IN JAPAN

0706

第2類医薬品

ただれ

かぶれ

かゆみ

ぶつぶつ

赤み

イハダ プリスクリード i は、かゆみ・かぶれなどに効果を発揮

△ 使用上の注意



■ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人 (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3)湿潤やただれのひどい人
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、刺激感(ヒリヒリ感)、熱感、乾燥感

- 1～2週間くらい使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

※ 目のまわりの皮膚はデリケートなので、やさしく塗ってください。眼軟膏ではありません。

開封口

I HADA

治療ケア

顔や目もとの かゆみ かぶれに効く



プリスクリードi（顔・からだ用）乳幼児にも使えます

ノンステロイド



テカらない
クリームタイプ

6g 第2類医薬品



49 09978 20448 8

セルフメディケーション

税 控除 対象



ケース

製造記号

使用期限

