



ゼリア新薬

ベトつかない、虫さされ・かゆみ止め

ジュラール®

かゆみ・  
虫さされ用薬

〔特 徴〕

蚊、ぶよ、蚤、南京虫、蜂、蟻あるいは毒虫などにさされると、はげしいかゆみや時には痛みが発生します。これは蟻酸などの酸性物質を主体としたものの刺激によるものといわれ、従来アンモニア水等が使用され効果をあげてきました。

ジュラールはこのアンモニア水を主体とし、これに抗ヒスタミン剤、収れん剤、清涼剤等を配合し、従来液剤であったアンモニア水をクリームタイプの製剤にし、使用しやすくしました。さらに、のびがよく、速乾性ですので衣服をよごしません。



⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

● 次の部位には使用しないでください

- (1) 口唇等の粘膜の部分や目のまわり。
- (2) 傷のある所、ただれたり、かぶれている所。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 湿潤やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、灼熱感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能・効果〕

虫さされ、かゆみ止め

〔用法・用量〕

適量を塗布又は擦り込んでください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用する場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用してください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。
- (4) 定められた用法・用量を守ってください。
- (5) 局所刺激作用があるので、患部に軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して患部に貼付しないでください。

(必ず裏面もお読みください)

## 〔成分〕

成分	分量	はたらき
アンモニア水	10%	局所刺激作用によりかゆみを緩和します。
dl-カンフル	1.5%	
l-メントール	1%	
ジフェンヒドラミン	0.5%	抗ヒスタミン作用により炎症を鎮めます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1%	収れん作用で患部を保護します。

添加物：ラウロマクロゴール，ラウリル硫酸ナトリウム，自己乳化型モノステアリン酸グリセリン，セタノール，白色ワセリン，軽質流動パラフィン，パラフィン，パルミチン酸イソプロピル，コロイド性含水ケイ酸アルミニウム

## 〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。また、揮発性であるので、使用後は密栓してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3661-2080  
〒103-8351 東京都中央区日本橋小舟町10-11  
受付時間 9:00～17:50 (土・日・祝日を除く)

ホームページ <http://www.zeria.co.jp>

### 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

ジュラールはゼリア新薬工業株式会社の登録商標です。



製造販売元

**ゼリア新薬工業株式会社**

東京都中央区日本橋小舟町10-11