

ご使用に際して、この添付文書をよくお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品



打ち身・ねんざ後のハレ 傷・ヤケドあとの皮膚のつっぱり ヘパリンZクリーム

外用消炎・血行促進薬

特 徴

- 主成分のヘパリンナトリウムが血液や組織液・リンパ液の循環を促進して、気になる打ち身やねんざ後のハレに効果を発揮します。
- 傷・ヤケドあとの皮膚のつっぱりなどもじっくりと治していきます。
- 白色でのびがよいクリームです。

有効成分ヘパリンナトリウムが患部の血行を促し、組織液・リンパ液の循環を促進。組織の新陳代謝を盛んにして打ち身やねんざ後の気になるハレを改善します。

打ち身など ▼



組織液・リンパ液の循環を促進

こんな症状にもオススメ

- 傷・ヤケドあとの皮膚のつっぱり
- 筋肉痛・関節痛に

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください
出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病など)の人。
(出血傾向を増強するおそれがあります。)
2. 次の部位には使用しないでください
(1) 目や目の周囲。
(2) 湿潤、ただれのひどい患部。

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

- ・打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛
- ・きず・ヤケドあとの皮膚のしこり・つっぱり(顔面を除く)
- ・しもやけ(ただれを除く)


用法・用量

1日1～数回、適量を患部に塗擦するか、ガーゼ等にのぼして貼付してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。
- (4) 定められた用法・用量を守ってください。

チューブの穴のあけ方



キャップを逆さにして、突起部をチューブの先に強く押し当ててあけてください。

成分 1g中

成分	分量	はたらき
ヘパリンナトリウム	500単位	血行を促して炎症を抑えます。

添加物：ステアリン酸，精製ラノリン，流動パラフィン，ミリスチン酸イソプロピル，セタノール，ソルビタンセスキオレイン酸エステル，トリエタノールアミン，パラオキシ安息香酸ブチル

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3661-2080
〒103-8351 東京都中央区日本橋小舟町10-11
受付時間 9:00～17:50（土・日・祝日を除く）

ホームページ <http://www.zeria.co.jp>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）



製造販売元

ゼリア新薬工業株式会社
東京都中央区日本橋小舟町10-11