

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所(冷暗所)にキャップをしっかりとめて立てて保管すること
 - (2) 小児の手の届かない所に保管すること
 - (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
 - (4) 火気に近づけないこと(エタノール含有物)
- キャップをしっかりとめないと液が漏れることがある
 - プラスチック製品(眼鏡わく、くし、便座等)、化繊の衣類、木材(塗料塗家具、床等)、皮革等に液がつくと損耗したり、シミになることがあるので注意すること
- 製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

あったらいいな/をかたにする

発売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室
0120-5884-01
9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社
〒567-0057 大阪府茨木市豊川11-30-3

税 控除 対象



使用に際して、この説明書きを必ずお読みください
使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

アメルツ レディーナ

販売名:アメルツ レディーナ
External Anti-Inflammatory / Analgesic

第3類医薬品 外用鎮痛消炎剤

特徴

- 1 有効成分の働きで、つらい肩こり、筋肉痛をしっかりと和らげます
- 2 オレンジシトラスのほのかな香りで、ニオイを気にせず安心して使えます
- 3 手が汚れず使いやすいヨコココボトル

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の部位には使用しないこと
(1)目の周囲、粘膜等(2)湿疹、かぶれ、傷口

🗨️ 相談すること

- 1 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 2 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- 3 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

肩こり、筋肉痛、筋肉疲労、腰痛、打撲、捻挫、関節痛

用法・用量

1日数回、患部に適量を塗布してください

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
- (3) 外用にのみ使用すること
●塗布部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないこと
●皮膚の特に弱い方は、同じ所に続けて使用しないこと
●ヒリヒリとした刺激が強い場合は、石けんで洗い流すと緩和します

成分・分量 100mL中

サリチル酸グリコール 2500mg
l-メントール 3000mg
クロルフェナミンマレイン酸塩 100mg
トコフェロール酢酸エステル 100mg
添加物として、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、エタノール、香料を含有する

火気厳禁 第一石油類 危険等級II
エタノール含有物

副作用被害救済制度
☎0120-149-931