

2012年7月(記載要領変更に伴う改訂)

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

プレカクリーム[®]

かゆみ・虫さされ用薬

第2類医薬品

プレカクリームは、かゆみや炎症を鎮めるステロイド性抗炎症剤 ヒドロコルチゾン酢酸エステル、皮ふに清涼感を与えるl-メントールやd-カンフルを配合した、かゆみを伴う皮ふ病、虫さされなどの症状を速やかに改善する、のびの良いクリーム剤です。

【使用上の注意】



してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)

1. 次の部位には使用しないでください。

- (1)水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- (2)目の周囲、粘膜等。

2. 顔面には、広範囲に使用しないでください。

3. 長期連用しないでください。

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4)患部が広範囲の人。
- (5)湿潤やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|--------|--------------------------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ、はれ |
| 皮膚（患部） | みずむし・たむし等の白せん、にきび、化膿症状、持続的な刺激感 |

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

かゆみ、虫さされ、じんましん、しつしん、皮ふ炎、あせも、かぶれ。

【用法・用量】

1日2～3回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3)外用にのみ使用してください。

【成 分】 (1g中)

| 成 分 | 分 量 | はたらき |
|--------------------|--------|-------------------------------------|
| ヒドロコルチゾン 酢酸エステル | 2.5 mg | ステロイド性抗炎症剤。 抗炎症・抗アレルギー作用などがあります。 |
| ジフェンヒドラミン | 10 mg | かゆみを抑えます。 |
| l-メントール | 10 mg | 清涼感を与え、かゆみを抑えます。 |
| d-カンフル | 10 mg | |

添加物としてステアリルアルコール、ステアリン酸ソルビタン、パラベン、プロピレングリコール、ポリソルベート60、香料、オクチルドデカノール、サリチル酸メチル、ステアリン酸、ラウロマクロゴール、ワセリンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光のあたらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。

問い合わせ先

- 1) 購入した薬局・薬店
- 2) 全薬工業お客様相談室

住 所：〒112-8650 東京都文京区大塚5-6-15

電 話：03（3946）3610

受付時間：9:00～17:00（土・日・祝祭日を除く）



製造販売元 **全薬工業株式会社**

東京都文京区大塚5-6-15

<http://www.zenyaku.co.jp>