

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

かきこわしてしまう
湿疹・皮膚炎、かゆみに

鎮痒消炎薬

ピロットリペア[®]ローション

第2類医薬品

販売名：ピロットリペアローション

ピロットリペアローションは、

- ・湿疹・かぶれ、皮膚炎に優れた局所作用を発揮し、体内に吸収されると低活性物質となるアンテドラッグステロイド(プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル)を配合した鎮痒消炎薬です。
- ・思わず掻いてしまいがちな症状を考え、患部の痒みを抑える2種類の鎮痒成分と、傷の治りを助けるアラントインをプラス配合しています。
- ・伸びが良く、頭髮部位にも使用できるローションタイプです。

【使用上の注意】



してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)

1. 次の部位には使用しないでください。
(1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
(2) 目や目の周囲、粘膜(例えば、口唇等)。
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください。
3. 長期連用しないでください。



してはいけません!

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 患部が広範囲の人。
(5) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。



関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白せん、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

湿疹、皮膚炎、かゆみ、あせも、かぶれ、虫さされ、じんましん

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。
万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) 本剤を塗布後、患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。

●適量とは…

大人の手2枚分の面積の患部に、本品を約0.5g使用するのが目安です。本品を手取る場合は、手・指を清潔にしてからご使用ください。



※1円玉位が目安。

患部が大人の手2枚分を超える広範囲の場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【成分】(1g中)

成分	分量	はたらき
プレドニゾン吉草酸エステル 酢酸エステル	1.5 mg	ステロイド性抗炎症剤(アンテドラッグステロイド)。 患部の湿疹、皮膚炎などの炎症を鎮め、体内に吸収された後は、低活性物質となります。
ジフェンヒドラミン	5 mg	患部のかゆみを抑えます。
クロタミトン	50 mg	
アラントイン	2 mg	傷の治りを早めます。
トコフェロール酢酸エステル (ビタミンE)	5 mg	血行を促進し、治癒を促します。
イソプロピルメチルフェノール	5 mg	殺菌作用により、患部の二次感染を防ぎます。

添加物としてエデト酸Na、クエン酸、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート60、カルボキシビニルポリマー、キサンタンガム、グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、1,3-ブチレングリコールを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光のあたらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。

問い合わせ先

- (1) お買い求めのお店
- (2) 全薬工業お客様相談室
住所：〒112-8650 東京都文京区大塚 5-6-15
電話：03 (3946) 3610
受付時間：9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)



製造販売元 **全薬工業株式会社**
東京都文京区大塚5-6-15
<https://www.zenyaku.co.jp>